

Ce médicament peut **interagir avec d'autres molécules**.

L'utilisation de plusieurs antiagrégants plaquettaires augmente le risque de saignement, de même que leur association à tout autre médicament augmentant les risques de saignement.

Ce médicament interagit avec les **AINS** (Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens), demandez conseil à votre pharmacien avant d'en associer à votre Kardégic (Advil, Ibuprofène, etc...) N'oubliez pas de **donner la liste complète des médicaments**, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



De nombreuses spécialités médicamenteuses contiennent de l'acide acétylsalicylique : prendre d'autres doses de ce composé en plus de votre Kardégic augmente le risque de saignement



Acide acétylsalicylique

KARDEGIC®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est un **antiagrégant plaquettaire**. C'est un fluidifiant du sang. Il empêche la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins.

Dosages disponibles	Présentation
Kardégic® 75 mg	Sachets-dose, boîtes de 30 sachets
Kardégic® 160 mg	Sachets-dose, boîtes de 30 sachets
Kardégic® 300 mg	Sachets-dose, boîtes de 30 sachets


Ce médicament **contient de l'aspirine** (acide acétylsalicylique). Ne pas prendre Kardégic si vous êtes allergique à l'aspirine. L'aspirine n'est pas un médicament sans risque.

Posologie Conseils de prise

Acide acétylsalicylique KARDEGIC®

Principaux effets indésirables

Plan de prise



Une prise quotidienne, pendant ou en dehors des repas, sans oublier.

Le contenu du sachet doit être dissous dans **un verre d'eau** :

- Verser le contenu du sachet dans un grand verre
- Ajouter de l'eau
- Une dissolution totale est obtenue rapidement

La posologie usuelle est de 1 sachet par jour

Bien respecter la dose prescrite par votre médecin.



Conservez hors de portée des enfants.

Conserver les sachets dans leur emballage extérieur, à l'abri de l'humidité

Ce médicament contient du **lactose** : prévenez votre médecin si intolérance

Quelques conseils



Surveiller étroitement **le risque de saignement**

Utiliser une brosse à dent souple, pour éviter le risque de saignement



Ne pas jeter les emballages ni les sachets dans votre poubelle. Rapportez-les à votre pharmacien



En cas d'intervention chirurgicale, signalez la prise de ce médicament au médecin ou à l'anesthésiste



N'arrêtez jamais votre traitement et ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



Si vous avez oublié de prendre Kardégic:

→ NE PAS doubler la dose pour compenser votre oubli

→ Continuer votre traitement normalement et prévenez votre médecin



Il est contre-indiqué de prendre Kardégic® à partir du 6ème mois de grossesse.

Il est déconseillé d'en prendre lors du début de grossesse et de l'allaitement. Parlez-en à votre médecin.

	Saignements	Apparition de saignements même mineur : -saignement de nez ou gengives -hématomes -hémorragie digestive -saignement au point d'injection en cas de piqûre -saignement oculaire, cérébral, pulmonaire ou articulaire -saignement dans les urines
	Intolérance gastrique, troubles digestifs	Prendre le médicament au cours d'un repas. Evitez les aliments épicés ou acides.
	Hypersensibilité	Signes d'une allergie : urticaires, œdèmes de Quincke, asthme, bronchospasme.

Si des saignements apparaissent, prévenez directement votre médecin.

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien;



Consultez immédiatement votre médecin ou appelez le SAMU en composant le 15 en cas :

- de saignement
- asthme, urticaire