



# Acide acétylsalicylique

## KARDEGIC®

# FICHE CONSEIL Professionnel

### Présentation et caractéristiques

**KARDEGIC est un antiagrégant plaquettaire et un antithrombotique.** Il empêche la formation de caillots. Il agit sur les plaquettes présentes dans le sang et permet de fluidifier le sang. L'effet persiste quelques jours après arrêt du médicament

Dosage	Présentation
<b>Kardégic® 75 mg</b>	Sachets-dose. Boîte de 30
<b>Kardégic® 160 mg</b>	Sachets-dose. Boîte de 30
<b>Kardégic® 300 mg</b>	Sachets-dose. Boîte de 30

- Ce médicament contient de l'aspirine, demander au patient si antécédents d'allergie et s'il prend déjà des médicaments contenant de l'acide acétylsalicylique.
- En cas de surdosage grave, transfert immédiat en milieu hospitalier spécialisé

### Indications

- **Prévention des complications cardiovasculaires et cérébrovasculaires liées à l'athérosclérose** chez les patients à haut risque vasculaire ayant une pathologie artérielle ischémique confirmée
- **Réduction de l'occlusion des greffons après pontage aorto-coronaire.**
- **Prévention des accidents vasculaires cérébraux chez les patients ayant une fibrillation auriculaire pour lesquels le traitement par antivitamine K est contre-indiqué ou non indiqué,** après examen du bénéfice et du risque

### Posologie et mode d'administration

<b>Dosage</b>	<b>Médicament administré que sur prescription médicale. Réservé à l'adulte. Voie orale</b> <b>Mode d'administration : verser le contenu du sachet dans un grand verre d'eau et ajouter de l'eau</b>
<b>75 mg</b>	Dosage réservé au traitement d'entretien. 1 sachet par jour
<b>160 mg</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pour les situations d'urgence cardiologiques</li><li>- Pour les situations d'urgence neurologique</li><li>- En traitement chronique, en dehors des situations d'urgence : la posologie recommandée est 1 sachet de 160 mg par jour</li></ul>
<b>300 mg</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pour les situations d'urgence cardiologiques</li><li>- Pour les situations d'urgence neurologique</li><li>- En traitement chronique, en dehors des situations d'urgence : la posologie recommandée est 1 sachet de 300 mg par jour</li></ul>



## Principaux effets indésirables

Effets secondaires	Prévention et conduite à tenir
<b>Saignement</b>	Dire au patient d'appeler le médecin en cas de saignements Apparition de saignements même mineur : -saignement de nez ou gencives -hématomes -hémorragie digestive -saignement au point d'injection en cas de piqûre -saignement oculaire, cérébral, pulmonaire ou articulaire -saignement dans les urines
<b>Troubles digestifs</b>	Prendre le médicament au cours d'un repas. Evitez les aliments épicés ou acides.
<b>Hypersensibilité</b>	Signes d'une allergie : urticaires, oedèmes, asthme

## Conseils à donner aux patients

- ⚠ Surveiller étroitement le risque de saignement. Utiliser une brosse à dent souple pour éviter les saignements.
- ⚠ Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. Le patient doit préciser à son médecin, la liste de ces médicaments avec ou sans ordonnance
- ⚠ Ne pas jeter les emballages ni les sachets à la poubelle. Les rapporter au pharmacien
- ⚠ Si oubli d'une prise, ne pas doubler la dose pour compenser. Continuer le traitement normalement, prévenir le médecin
- ⚠ Contacter rapidement le médecin en cas de :
  - Signes hémorragiques
  - Signes d'allergie

## Contre-indications

- Hypersensibilité à la substance active (l'acide acétylsalicylique) ou à l'un des excipients, ou aux autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (réaction croisée).
- Antécédents d'asthme induits par l'administration de salicylés ou de substances d'activité proche, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- Ulcère gastroduodéal en évolution.
- Toute maladie hémorragique constitutionnelle ou acquise.
- Grossesse, à partir du début du 6e mois (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée)
- Patients atteints d'une mastocytose, chez lesquels l'utilisation de l'acide acétylsalicylique peut entraîner des réactions d'hypersensibilité sévères (y compris les chocs circulatoires avec bouffées vasomotrices, hypotension, tachycardie et des vomissements).
- Risque hémorragique
- Thrombopénie
- Insuffisance hépatique sévère.
- Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min).
- Insuffisance cardiaque sévère non contrôlée.
- Accident vasculaire cérébral
- Cytopénie

## Interactions médicamenteuses

Kardegic® interagit avec **les autres anti-coagulants, AINS et antiagrégants plaquettaires.**

**Il faut éviter de prendre Kadégic** avec des médicaments contenant eux aussi de l'acide acétylsalicylique ; cela augmenterait le risque de saignement

*Liste non exhaustive. Pour voir la liste complète, regarder le Vidal*

## Grossesse

**Il est contre-indiqué de prendre Kardégic® à partir du 6<sup>ème</sup> mois de grossesse.** Il est déconseillé d'en prendre au début de la grossesse à des doses supérieures ou égales à 500mg/j et pendant l'allaitement.