



Ticlopidine

TICLID®

FICHE
CONSEIL
Professionnel

Présentation et caractéristiques

TICLID est un antiagrégant plaquettaire et antithrombotique. Il empêche la formation de caillots. Il agit sur les plaquettes présentes dans le sang et permet de fluidifier le sang. L'effet persiste quelques jours après arrêt du médicament .

Dosage	Présentation
Ticlid® 250 mg	Comprimé pelliculé blanc. Boîte de 30.

- Au début du traitement, procéder à des numérations-formules sanguines puis toutes les 2 semaines pendant les 3 premiers mois de traitement. Dans le cas d'une neutropénie (< 1 500 neutrophiles/mm3) ou d'une thrombopénie (< 100 000 plaquettes/mm3), il est nécessaire d'arrêter le traitement.
- Des cas d'agranulocytose, de pancytopénie et des rares cas de leucémie ont été rapportés

Indications

•Prévention des complications thrombotiques artérielles (accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, mort de cause vasculaire) après un premier accident ischémique cérébral lié à l'athérosclérose.

Une étude clinique a mis en évidence une efficacité quelque peu supérieure de la ticlopidine par rapport à l'aspirine dans la prévention secondaire de ces complications thrombotiques, efficacité qu'il convient de mettre en balance avec les effets indésirables de la ticlopidine

•Prévention des accidents ischémiques majeurs, en particulier coronariens, chez les patients souffrant d'une artérite chronique oblitérante des membres inférieurs au stade de la claudication intermittente authentifiée.

•Prévention des thromboses itératives des abords artérioveineux en hémodialyse chronique.

•Prévention de la thrombose subaiguë sur endoprothèse coronaire (stent).

Posologie et mode d'administration

Indications	Mode d'administration chez l'adulte :
Ensemble des indications	2 comprimés par jour (500mg) à prendre pendant les repas
Endoprothèse coronaire	Traitement institué juste avant ou le jour de la pose de l'endoprothèse Et poursuivi pendant 4 à 6 semaines à la posologie de 2 comprimés par jour (500mg), en association avec l'aspirine (100 à 325 mg/j) La prescription sera relayée par l'aspirine seule (75 à 100 mg, dose maximale : 300/325 mg)



Principaux effets indésirables

Effets secondaires	Prévention et conduite à tenir
Saignement	Apparition de saignements même mineur : -saignement de nez ou gencives -hématomes -hémorragie digestive -saignement au point d'injection en cas de piqûre -saignement oculaire, cérébral, pulmonaire ou articulaire -saignement dans les urines
Baisse du nombre de globules blancs ou plaquettes	Effectuer régulièrement des analyses
Hypersensibilité	Urticaires, rash cutanée maculopapulaire ,...
Troubles digestifs	Manger lentement. Faire des petits repas. Boire entre les repas. Evitez les aliments épicés.

Interactions médicamenteuses

Ticlid® interagit avec **les autres anti-coagulants, AINS et antiagrégants plaquettaires**.

Il faut éviter de prendre Ticlid® avec des médicaments contenant de l'acide acétylsalicylique ; cela augmenterait le risque de saignement.

Il est aussi déconseillé d'associer Ticlid® avec Anagrélide et Défibrotide

Liste non exhaustive. Pour voir la liste complète, regarder le Vidal

Grossesse

Il est déconseillé de prendre Ticlid® lors de la grossesse ou de l'allaitement sauf en cas nécessité absolue

Conseils à donner aux patients

- ⚠ Surveiller étroitement le risque de saignement.
- ⚠ Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. Le patient doit préciser à son médecin, **la liste de ces médicaments avec ou sans ordonnance**
- ⚠ Ne pas jeter les emballages ni les comprimés à la poubelle. Les rapporter au pharmacien
- ⚠ **Si oubli d'une prise Ticlid®**, ne pas doubler la dose pour compenser la dose oubliée.
- ⚠ **Des sensations vertigineuses, céphalées** peuvent survenir avec ce médicament, cela peut altérer l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.
- ⚠ En cas d'intervention chirurgicale, signalez la prise de ce médicament au médecin ou à l'anesthésiste au moins 1 semaine avant l'opération
- ⚠ Contacter rapidement le médecin en cas de :
 - Signes hémorragiques
 - Signes d'allergie

Contre-indications

- Hypersensibilité à la ticlopidine ou à l'un des excipients
- Diathèses hémorragiques.
- Lésions organiques susceptibles de saigner : ulcère gastroduodéal en période d'activité ou accident vasculaire cérébral hémorragique en phase aiguë.
- Hémopathies comportant un allongement du temps de saignement.
- Antécédents de troubles hématologiques (leucopénie, thrombopénie ou agranulocytose).