

Clopidogrel

PLAVIX®

FICHE CONSEIL Professionnel

Présentation et caractéristiques

PLAVIX est un **antiagrégant plaquettaire et antithrombotique**. Il empêche la formation de caillots. Il agit sur les plaquettes présentes dans le sang et permet de fluidifier le sang. L'effet persiste quelques jours après arrêt du médicament

Dosage	Présentation
Plavix® 75 mg	Comprimé pelliculé. Boîte de 30 ou 50
Plavix® 300 mg	Comprimé pelliculé. Boîte de 30

Indications

Prévention secondaire des événements athérothrombotiques : Le clopidogrel est indiqué :

- Chez les patients adultes souffrant d'un infarctus du myocarde (datant de quelques jours à moins de 35 jours), d'un accident vasculaire cérébral ischémique (datant de plus de 7 jours et de moins de 6 mois) ou d'une artériopathie oblitérante des membres inférieurs établie.

- Chez les patients adultes souffrant d'un syndrome coronaire aigu :

- Syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST (angor instable ou infarctus du myocarde sans onde Q), y compris les patients bénéficiant d'une angioplastie coronaire avec pose de stent, en association à l'acide acétylsalicylique (AAS).

- Infarctus du myocarde aigu avec sus-décalage du segment ST, en association à l'AAS chez les patients traités médicalement et éligibles à un traitement thrombolytique.

Prévention des événements athérothrombotiques et thromboemboliques dans la fibrillation auriculaire :

Chez les patients adultes souffrant de fibrillation auriculaire, qui présentent au moins un facteur de risque d'événements vasculaires, qui ne peuvent être traités par un antivitamine K (AVK) et qui présentent un faible risque de saignements, le clopidogrel est indiqué, en association avec l'AAS, dans la prévention des événements athérothrombotiques et thromboemboliques, incluant l'AVC.

Posologie et mode d'administration

Indications	Posologie <i>(Plavix® peut être pris au cours ou en dehors des repas)</i>
Syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du segment ST	Dose de charge unique de 300 mg. Puis poursuivi par une prise quotidienne de 1 comprimé Plavix® à 75 mg (en association à l'AAS à la dose quotidienne de 75 mg à 325 mg).
Infarctus du myocarde aigu avec sus-décalage du segment ST	Dose de charge unique de 300 mg, associé ou non à un traitement thrombolytique. Puis poursuivi par une prise quotidienne d'un comprimé à 75 mg en association à l'AAS. Chez les patients de plus de 75 ans, le traitement doit être initié sans dose de charge.
Fibrillation auriculaire	Le clopidogrel doit être administré en une prise quotidienne de 75 mg. L'AAS (75 à 100 mg/jour) doit être administré en association avec le clopidogrel, dès l'initiation du traitement



Principaux effets indésirables

Effets secondaires	Prévention et conduite à tenir
Saignement	Dire au patient d'appeler le médecin en cas de saignements Apparition de saignements même mineur : -saignement de nez ou gencives -hématomes -hémorragie digestive -saignement au point d'injection en cas de piqûre -saignement oculaire, cérébral, pulmonaire ou articulaire -saignement dans les urines
Troubles digestifs	Manger lentement. Faire des petits repas. Boire entre les repas. Évitez les aliments épicés.
Hypersensibilité (rare)	Signes d'une allergie : urticaires, oedèmes, asthme

Interactions médicamenteuses

Plavix® interagit avec **les autres anti-coagulants, AINS et antiagrégants plaquettaires.**

Il faut éviter de prendre Plavix® avec des AINS, de l'oméprazole ou esoméprazole, fluoxétine

Liste non exhaustive. Pour voir la liste complète, regarder le Vidal

Grossesse

Il est préférable de ne pas prendre Plavix® au cours de la grossesse et pendant l'allaitement

Conseils à donner aux patients

- ⚠ Surveiller étroitement le risque de saignement. Utiliser une brosse à dent souple pour éviter les saignements.
- ⚠ Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. Le patient doit préciser à son médecin, la liste de ces médicaments avec ou sans ordonnance
- ⚠ Ne pas jeter les emballages ni les comprimés à la poubelle. Les rapporter au pharmacien
- ⚠ Si oubli d'une prise : La prise est possible dans les 12 heures après l'heure habituelle. Passé ce délai, ne pas rattraper la dose oubliée. Prendre la dose suivante à l'heure habituelle. Ne pas doubler la dose pour compenser
- ⚠ Contacter rapidement le médecin en cas de :
 - Signes hémorragiques
 - Signes d'allergie

Contre-indications

- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients
- Insuffisance hépatique sévère.
- Lésion hémorragique évolutive telle qu'un ulcère gastroduodénal ou une hémorragie intracrânienne.