

Ce médicament **peut interagir avec d'autres molécules.**


**Ne pas consommer de jus de pamplemousse, de millepertuis ou d'alcool.**

**Ne pas manger ni boire lors de la prise d'Actiq®.**

Donner la liste complète de vos médicaments même ceux vendus sans ordonnance, à base de plante et les produits naturels à votre médecin.



**Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien**



## Fentanyl transmuqueux ACTIQ®

### À quoi sert ce médicament ?

Ce puissant médicament est **utilisé pour soulager une exacerbation passagère** de la douleur chez les **adultes ayant des douleurs chroniques liées à un cancer.**

Dosages disponibles	Présentations
<b>Actiq® 200 µg</b>	Comprimé avec applicateur buccal Boîte de 3
<b>Actiq® 400 µg</b>	
<b>Actiq® 600 µg</b>	
<b>Actiq® 800 µg</b>	
<b>Actiq® 1200 µg</b>	
<b>Actiq® 1600 µg</b>	

# Posologie Conseils de prise


## Fentanyl transmuqueux ACTIQ®

# Principaux effets indésirables


- Le médecin va déterminer la posologie efficace d'Actiq qui est propre à chaque patient
- Une fois la dose efficace établie, les patients doivent **utiliser cette dose et limiter leur consommation à un maximum de 4 unités d'Actiq par jour.**
- Si 4 doses par jour ne vous suffisent pas, **contactez le médecin** pour qu'il change votre traitement.

### Comment utiliser Actiq® ?

-Ouvrir le blister au moment de l'utilisation. Tenir fermement la partie la plus courte du blister.  
-Placez les ciseaux près de l'extrémité opposée d'ACTIQ et coupez entièrement la languette la plus longue comme indiqué sur le dessin.



- Retirer complètement l'opercule (partie imprimée) du blister.
- Sortir l'unité d'ACTIQ du blister et placer aussitôt le comprimé d'ACTIQ dans votre bouche



Placer le comprimé contre la face interne de la joue  
· Frottez en continu l'applicateur contre la face interne de la joue. Tournez souvent l'applicateur.



Pour obtenir un soulagement maximum, le comprimé d'ACTIQ doit être dissout en 15 minutes.

### Quelques conseils



**Sportif** : ce médicament contient une substance susceptible de rendre positifs certains tests antidopage



Se laver soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de l'applicateur.



**Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle.** Rapportez-les à votre pharmacien.



**N'arrêtez jamais votre traitement et ne modifiez jamais le rythme d'administration** sans avis du prescripteur.



**Si vous avez encore un accès douloureux paroxystique**, vous pouvez utiliser ACTIQ, tel que votre médecin vous l'a conseillé. **Si l'accès douloureux paroxystique est terminé**, n'utilisez pas ACTIQ avant le prochain accès douloureux paroxystique.



Actiq peut induire une **somnolence**, augmentée par l'alcool ou des médicaments sédatifs. **Il est déconseillé de conduire ou d'utiliser des machines dangereuses**



Actiq **ne doit pas être pris pendant la grossesse et l'allaitement.** Si le médecin le juge indispensable, une prise **SOUS SURVEILLANCE** est possible pendant la grossesse, mais pas l'allaitement (il faut compter au moins 5j entre la prise de ce médicament et la reprise de l'allaitement).

	<b>Somnolence, céphalées, vertiges</b>	Prudence en cas de conduite de véhicule.
	<b>Difficultés respiratoires</b>	Signes d'alertes : essoufflement, respiration superficielle et lente. Informer votre médecin
	<b>Troubles digestifs : nausées, vomissement, constipation</b>	Boire entre les repas. Evitez les aliments froids, gras ou épicés. Mangez lentement. Faites plusieurs petits repas légers.
	<b>Asthénie</b>	Se reposer. Faire des exercices légers comme la marche
	<b>Sécheresse buccale, caries</b>	Avoir une bonne hygiène dentaire car Actiq contient du sucre. Bien s'hydrater. Eviter les aliments trop chauds et trop durs. Eviter de fumer.

Si ces effets indésirables persistent, prévenez votre médecin.

Si vous présentez des **effets indésirables non mentionnés**, veuillez en **informer votre médecin ou pharmacien**;