


Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et de produits naturels à votre médecin.



Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



L'équipe de la pharmacie de l'hôpital :
.....
.....
.....

Reste à votre disposition pour toute question ou tout renseignement sur votre traitement.

Horaires d'ouverture :
.....
.....
.....

Téléphone :
.....
.....
.....

Acide obéticholique

OCALIVA®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement d'une maladie du foie appelée « cholangite biliaire primitive ».

Il est prescrit par un médecin spécialiste en hépato/gastro-entérologie.

Il est disponible uniquement en pharmacie hospitalière.

Il existe deux dosages :

- OCALIVA® 5 mg : flacon de 30 comprimés pelliculés jaunes et ronds
- OCALIVA® 10 mg : flacon de 30 comprimés pelliculés jaunes et triangulaires

Posologie Conseils de prise



Plan de prise



La dose recommandée est de **1 comprimé** de 5 mg une fois par jour.

Votre **médecin** peut **augmenter la dose** jusqu'à 10 mg une fois par jour, en fonction de la réponse de votre organisme après 6 mois de traitement.

Il peut également **adapter la dose** et **espacer les prises d'OCALIVA®** en fonction du **fonctionnement** de votre foie ou si vous éprouvez des **démangeaisons**.

N'hésitez pas à contacter votre médecin ou pharmacien en cas de doute sur le plan de prise d'OCALIVA®.

Les comprimés d'OCALIVA® peuvent être pris **pendant ou en dehors des repas**.



Conserver hors de portée des enfants.



Contactez rapidement votre médecin en cas de :

- démangeaisons difficiles à tolérer
- jaunissement de la peau

Acide obéticholique OCALIVA®

Quelques conseils



Les comprimés sont à **avalés entiers** (ni brisés, ni mâchés) par voie orale, avec un verre d'eau, pendant ou en dehors des repas.



N'arrêtez jamais votre traitement et ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du prescripteur.



Si vous avez oublié une prise d'OCALIVA®, prenez la dose suivante au moment habituel, sans la doubler.



Si votre médecin vous a prescrit des **résines chélatrices d'acides biliaires** pour diminuer vos démangeaisons (cholestyramine, colestipol, colesevelam), respectez un **intervalle de 4-6 heures** minimum avec la prise d'OCALIVA®.



La prise d'OCALIVA® est **déconseillée** pendant la grossesse et l'allaitement.

Principaux effets indésirables

	Démangeaisons	Surviennent le plus souvent durant le 1 ^{er} mois de traitement. En cas de gêne importante, prévenez votre médecin.
	Anomalies de la fonction hépatique	Un contrôle de la fonction hépatique sera réalisé avant de débiter le traitement. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin.
	Douleurs abdominales, inconfort digestif, constipation	Contactez votre médecin si ces effets surveillent fréquemment.
	Battements de cœur rapides ou irréguliers	Contactez votre médecin si vous ressentez un ou plusieurs de ces effets indésirables.
	Gonflement des mains et des pieds	
	Douleurs dans la bouche	
	Jaunissement de la peau ou des yeux	
	Douleurs aux articulations	

Si ces effets indésirables **persistent**, **prévenez votre médecin**.

Si vous présentez des effets indésirables **non mentionnés**, veuillez en **informer votre médecin** ou **pharmacien**.