



LECTURE DE L'ÉVÉNEMENT

Méthotrexate destiné à être utilisé une fois par semaine, administré quotidiennement

Selon vous ? Au regard de l'événement qui vous a été relaté et au regard de votre expérience ?



QUELS SONT LES FACTEURS CONTRIBUTIFS POSSIBLES ?



QUELLES SONT LES ACTIONS ET BARRIÈRES ?

Organisationnels

Manque de procédure ou de formation suffisante

...

Mise en place d'une procédure en cas de surdosage

...

Environnementaux

Manque de temps

...

S'assurer de la bonne compréhension par le patient des modalités de prise

...

Technique

Présentations commerciales multiples avec des dosages et conditionnements différents selon les laboratoires, parfois inadaptés pour les posologies usuelles en médecine de ville

...

Les laboratoires commercialisant des spécialités à base de méthotrexate

...

Humains

Manque de temps dédié à l'entretien patient et/ou entourage sur la compréhension de sa pathologie et de son traitement

...

Mise à disposition de matériel éducationnels pour les professionnels de santé

...



QUIZ

Quels sont les symptômes d'un surdosage au méthotrexate ?

Quel est le traitement du surdosage ?



POUR ALLER + LOIN...

- Recommandations ANSM (9/04/2020) : [lien](#)
- Fiche retour d'expérience N°37 PRAGE / CCECQA : [lien](#)
- Base de données publique des médicaments : [lien](#)



Où retrouver nos autres fiches ?
<https://www.omedit-normandie.fr/>



Declarer les évènements indésirables **ICI** ?



SOLUTION DE L'ÉVÈNEMENT

Surdosage en méthotrexate par voie orale

Erreur de prescription	Erreur de dispensation	Erreur d'administration
Confusion sur la posologie, entre les dosages Absence de mention de l'indication pour laquelle le méthotrexate est prescrit Absence de dosage Absence de posologie en mg Absence d'information concernant le jour d'administration Utilisation d'abréviation	Non vérification de l'indication Absence de dosage Absence de posologie en mg Vérifier le jour de prise hebdomadaire Utilisation d'abréviation Absence d'information patient sur la prise hebdomadaire	Erreur de dose Rythme hebdomadaire d'administration non respecté



FACTEURS CONTRIBUTIFS POSSIBLES



ACTIONS ET BARRIERES

Organisationnels

Manque de procédure ou de formation suffisante
Absence de remise d'une carte alerte patient

Mise en place d'une procédure en cas de surdosage
Remise d'une carte alerte patient à chaque délivrance

Environnementaux

Manque de temps, forte affluence

Demander au patient de répéter les instructions relatives à la prise de méthotrexate par voie orale
S'assurer de la bonne compréhension par le patient des modalités de prise

Technique

Présentations commerciales multiples avec des dosages et conditionnements différents selon les laboratoires, parfois inadaptés pour les posologies usuelles en médecine de ville

Impossibilité de mentionner le jour de prise sur le logiciel d'aide à la prescription

Les laboratoires commercialisant des spécialités à base de méthotrexate ont ajouté un rappel visuel sur l'emballage extérieur et sur le conditionnement primaire afin de souligner l'importance de la posologie hebdomadaire.
Demande de correction faite auprès de l'éditeur logiciel

Humains

Manque de communication entre professionnels, manque de temps dédié à l'entretien patient et/ou entourage sur la compréhension de sa pathologie et de son traitement
Patient souvent âgés, particulièrement sensible aux toxicités graves

Mise à disposition de matériel éducationnels pour les professionnels de santé : doit être lu en parallèle du résumé caractéristique des produits du méthotrexate



QUIZ

Quels sont les symptômes d'un surdosage au méthotrexate ?

Symptômes fréquents lors d'un surdosage	Symptômes très fréquents	D'autres effets indésirables peuvent survenir (liste non exhaustive, voir RCP)
Nausées Vomissements	Fièvre Fatigue inhabituelle	Paresthésie / Hypoesthésie
Diarrhées sévères	Plaies Inflammation de la bouche	Toux Pneumopathie interstitielle
Ecchymoses- Saignements inexpliqués Selles foncés - Sang dans les selles Leucopénie –Thrombocytopenie - Anémie	Rash Alopécie	Pneumonie Infection

Quel est le traitement du surdosage ?

Administration le plus tôt possible de folinate de calcium, antidote spécifique du méthotrexate. Il sera administré aussi longtemps que le demandera la méthotrexatémie.



Où retrouver nos autres fiches ?
<https://www.omedit-normandie.fr/>



Declarer les évènements indésirables [ICI](#) ?