



QU'EST-CE QUE SPRYCEL® DASATINIB ?

- Anticancéreux utilisé dans le traitement de certains types de cancer du sang (leucémies)
- Prescrit et renouvelé par votre médecin hospitalier spécialiste en oncologie, cancérologie ou hématologie
- Disponible en pharmacie hospitalière sur présentation de votre ordonnance



- Suspension buvable de couleur blanche à jaune opaque, dosée à **10 mg/mL**
- La reconstitution de la suspension buvable est faite par un pharmacien ou un professionnel de santé qualifié avant dispensation.
- Flacon fourni avec une seringue pour administration orale de 12 mL



- A conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C), pendant 60 jours maximum
- Conserver le flacon en position verticale, hors de la vue et de la portée des enfants.
- Lavez-vous soigneusement les mains avant et après chaque manipulation de la suspension.
- Ne jetez pas les flacons entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien.


COMMENT PRENDRE CE MÉDICAMENT ?



A remplir avec
l'aide
d'un professionnel
de santé**

Renseigné avec

.....
selon l'ordonnance
du
...../...../.....

Dose par jour mg = mL
Quand ?	= 1 prise par jour, pendant ou en dehors des repas Mélange possible avec du lait, du yaourt, du jus ou de la compote de pomme.
Comment ?	 <p>① Remuez le flacon (~ 30 sec), retirez le bouchon et vérifiez que l'adaptateur est bien enfoncé sur le flacon. ② Veillez à ce que le piston de la seringue de 12 mL fournie soit enfoncé au maximum, puis en tenant le flacon à la verticale, insérez fermement la pointe de la seringue dans l'adaptateur. ③ Maintenez la pointe de la seringue bien enfoncée dans le flacon, et retournez-le avec la seringue tournée vers le bas. ④ Prélevez le nombre de mL nécessaire en tirant lentement sur le piston. ⑤ Maintenez la pointe de la seringue bien enfoncée dans le flacon et retournez-le de nouveau. ⑥ Retirez la seringue du flacon. ⑦ Placez la seringue dans la bouche entre le côté et la langue, puis enfoncez lentement le piston jusqu'à ce que la totalité de la dose ait été administrée. Si la dose à administrer est supérieure à 11 mL, reprenez les étapes 2 à 7. ⑧ Lavez la seringue à l'eau après chaque administration, sans la démonter (ne la mettez pas au lave-vaisselle).</p>

Vous pouvez vous aider du **carnet de suivi*** et d'un **calendrier** pour repérer les prises.

N'arrêtez jamais ou ne modifiez jamais le rythme de prise de votre traitement sans l'avis de votre médecin.

** Cette fiche n'est pas une ordonnance, référez-vous à votre ordonnance la plus récente.

QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI OU DE VOMISSEMENTS ?



- **En cas d'oubli**, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, sans la doubler. Pensez à le noter dans votre carnet de suivi*.
- **En cas de vomissement**, ne prenez pas de nouvelle dose. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle, sans la doubler. Pensez à le noter dans votre carnet de suivi*.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS ET/OU VOTRE ALIMENTATION

Vérifiez avec **votre médecin et votre pharmacien** que les médicaments (prescrits ou non) et/ou autres substances (aliments et plantes, dont **pamplemousse** et **millepertuis**, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires...) que vous utilisez sont compatibles avec votre traitement. Des interactions peuvent influencer sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables.

- Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement.
- Interrompez l'allaitement durant le traitement.

*Carnet de suivi disponible sur les sites www.omeditbretagne.fr ou www.omedit-paysdelaloire.fr

QUELS EFFETS INDÉSIRABLES PEUVENT SURVENIR AVEC SPRYCEL® DASATINIB ?

Comme tous les médicaments, Dasatinib peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

	Effets indésirables	Prévention
	Nausées, vomissements, perte d'appétit	Mangez lentement et fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas.
	Diarrhées, douleurs abdominales	Pensez à bien vous hydrater : au moins 2L d'eau par jour. Privilégiez une alimentation pauvre en fibres (féculents, carotte, banane...). Evitez certains aliments qui peuvent augmenter le transit intestinal (café, boissons glacées, laitages, alcool, fruits-légumes crus, céréales, aliments gras, épices...). Buvez plutôt entre les repas. Surveillez régulièrement votre poids.
	Gonflement du visage et des membres	Evitez les vêtements serrés. Maintenez une alimentation à faible teneur en sel. En cas de gonflement des jambes, élevez les pieds en position assise et portez des bas de contention. Surveillez votre poids régulièrement.
	Saignements inhabituels	Utilisez une brosse à dent souple pour éviter les saignements buccaux. Evitez l'utilisation d'un thermomètre rectal. Ne prenez ni aspirine, ni anti-inflammatoire (ex : ibuprofène) sans avis médical.
	Signes d'infections (fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires)	Limitez les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Si vous présentez une fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre médecin.
	Douleurs musculaires	Hydratez-vous fréquemment. Prenez des temps de repos et faites des exercices légers (ex : marche). Evitez les mouvements répétitifs et les efforts physiques importants. En cas de douleurs importantes, contactez votre médecin pour mise en place d'un traitement symptomatique.

Seuls certains des effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Vous pouvez également poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

 Dans tous les cas, pensez à faire pratiquer les examens biologiques prescrits par votre médecin.

QUE FAIRE EN CAS DE SURVENUE D'EFFET(S) INDÉSIRABLE(S) ?

- Prenez les médicaments prescrits contre les effets indésirables en respectant les doses.
- Respectez les mesures de prévention.

Contacts utiles :

Contactez rapidement votre médecin en cas de :

- Difficultés à respirer, douleurs dans la poitrine, sueurs
- Ecchymoses, saignements inhabituels, sang dans les vomissements, les selles ou les urines
- Fièvre, frissons importants
- Fatigue, confusion, évanouissement
- Tout effet indésirable persistant ou s'aggravant



Remarques :
