


Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels à votre médecin.



Informez votre médecin en cas de traitement en cours à base de rifampicine ou de millepertuis .

En règle générale, ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



L'équipe de la pharmacie de l'hôpital :

.....
.....

Reste à votre disposition pour toute question ou tout renseignement sur votre traitement.

Horaires d'ouverture :

.....
.....
.....

Tél :

.....
.....

Ambrisentan

VOLIBRIS®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est un **traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Il améliore la circulation sanguine pulmonaire.**

Il est prescrit par un **médecin hospitalier, spécialiste en cardiologie ou pneumologie ou médecine interne.**

Il est disponible uniquement dans les **pharmacies hospitalières.**

Il existe 2 dosages :

- **5 mg** : boîte de 30 comprimés carrés roses pâles

- **10 mg** : boîte de 30 comprimés ovales roses foncés

Posologie Conseils de prise

Plan de prise



La posologie est de **1 comprimé par jour** de 5 mg ou 10 mg au cours ou en dehors d'un repas

.....

.....

.....



En cas d'oubli, prenez le comprimé oublié dès que possible. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle.

Si vous avez pris plus de VOLIBRIS® que vous n'auriez dû, vous risquez de voir apparaître des effets indésirables. Informez immédiatement votre médecin.



N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre médecin.

Ambrisentan VOLIBRIS®

Quelques conseils



Le comprimé doit être avalé entier avec un verre d'eau.



Prendre ce médicament aux **mêmes heures chaque jour** vous aidera à ne pas oublier votre traitement.



Ne pas couper, écraser ou mâcher le comprimé.



Ce médicament contient du lactose, informez votre médecin en cas d'**intolérance au lactose ou au galactose**.



Ne pas utiliser pendant une grossesse. Des tests de grossesse seront à réaliser tous les mois. L'allaitement est interdit pendant le traitement.

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien;

Principaux effets indésirables

	Maux de tête	PARACETAMOL efficace dans la plupart des cas A noter: évitez les comprimés effervescents si vous êtes soumis à un régime pauvre en sel (teneur élevée en sel) Si les douleurs sont trop importantes, parlez-en à votre médecin
	Rougeurs de la face	Cet effet est normal. Vous pouvez l'atténuer en utilisant une base de maquillage verte
	Gonflement des jambes et des chevilles	Parlez-en à votre médecin.
	Perturbation du bilan biologique (anémie, perturbations au niveau du foie)	Il est important de réaliser les prises de sang prescrites par votre médecin et de lui rapporter les résultats à chaque RDV.
	Vertiges/hypotension	Evitez de vous lever trop brusquement.
	Diarrhées, reflux, nausées, inconfort digestif	Mangez lentement. Evitez les repas trop riches et trop copieux.
	Rhinite	Lavage du nez au sérum physiologique