



TALYMUS 1 mg/ml, collyre en suspension

Tacrolimus

Prescription réservée aux spécialistes en Ophtalmologie

Médicament sous ATU

Délivré uniquement en pharmacie hospitalière

INDICATIONS

- Certaines conjonctivite ou kératoconjonctivite sévères
- Kératoconjonctivite vernale, avec résistance à la ciclosporine, corticodépendance

CONTRE INDICATIONS

- Antécédents d'hypersensibilité à des ingrédients de ce produit
- Patients souffrant d'une infection oculaire (l'infection peut s'aggraver en raison de l'effet immunosuppresseur du Talymus)

MODALITES D'ADMINISTRATION

Posologie habituelle : 1 goutte dans chaque œil affecté 2 fois par jour

- Bien secouer le flacon pour mélanger.
- Comprimer la zone du sac lacrymal tout en fermant l'œil pendant 1 à 5 minutes après l'instillation.
- Eviter de toucher le bout du récipient directement contre l'œil.
- Essuyer tout excès de médicament sur la paupière, peau, etc. après instillation.

Lorsqu'une autre solution ophtalmique est utilisée de manière concomitante, attendre au moins 5 minutes entre différents médicaments

Le chlorure de benzalkonium peut être absorbé par les lentilles de contact. Les patients portant des lentilles de contacts doivent les retirer avant instillation et attendre un temps suffisant avant de les réinsérer

EFFETS INDESIRABLES (non exhaustif)

Il peut s'agir le plus souvent de :

- Sensation de brûlure dans les yeux, irritation, larmoiements
- Plus rarement : Asthénopie, œil sec, œil, décharge, douleur oculaire, oculaire hyperémie, photophobie, kératite

La sécurité de ce produit n'a pas été établie chez les nourrissons de faible poids à la naissance, les nouveau-nés, les nourrissons allaités ou jeunes enfants de moins de 6 ans

TOUT EFFET INDESIRABLE DOIT ETRE SIGNALE A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES


La prise concomitante de nouveaux médicaments non contrôlés par un médecin ou un pharmacien peut entraîner une **diminution de l'efficacité** de votre traitement.

COMMENT LE CONSERVER ?

A l'abri de la lumière, à température ambiante, en position verticale

Ne pas retirer le film du corps du conteneur (à l'exclusion du film sur le capuchon) car le film résistant à la lumière maintient la qualité du produit

Ne prenez jamais un médicament sans prévenir votre médecin ou votre pharmacien.



Service de pharmacie 📞 02 31 06 46 66

Horaires d'ouvertures : 8h30 - 17h du lundi au vendredi
9h - 12h30 le samedi

Votre infirmière coordinatrice :

📞

Votre Médecin, Docteur :

📞