

Ce médicament peut interagir avec d'autres molécules.

N'oubliez pas de communiquer à votre médecin ou votre pharmacien la liste complète des médicaments que vous prenez, même ceux vendus sans ordonnance, à base de plantes et les produits naturels



Si vous êtes sous AVK (Préviscan®, Coumadine®, Sintrom®) ou anticoagulants oraux (Xarelto®, Eliquis®..), veuillez en informer votre médecin et votre pharmacien, La vitamine E pourrait augmenter le risque de saignement. Veuillez aussi les informer de la prise d'oestrogènes.

En règle générale, ne prenez pas de nouveaux médicaments sans informer votre médecin ou votre pharmacien.



L'équipe de la pharmacie de l'hôpital :

.....
.....

Reste à votre disposition pour toute question ou tout renseignement sur votre traitement.

Horaires d'ouverture :

.....
.....
.....

Tél :

.....
.....

VITAMINE E 100mg/ml, suspension buvable

DL-alpha-tocopheryl acetate 100mg/ml

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement et la prévention de la carence en vitamine E dans les situations suivantes :

- En cas de malabsorption en lien notamment avec une cholestase, une insuffisance intestinale ou une insuffisance pancréatique incluant la mucoviscidose
- Chez les patients ne pouvant avaler les formes solides de vitamine E

Il est disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières.

C'est une suspension buvable administrable par voie orale. Il est possible de la diluer dans un peu de sirop de glucose et d'eau, L'administration devra se faire immédiatement après dilution.

Posologie Conseils de prise

Vitamine E buvable 100mg/mL flacon de 100mL

Principaux effets indésirables

Plan de prise

Mucoviscidose (fibrose kystique)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nourrissons de moins de 1 an : 50 mg/j ▶ Enfants : 100 mg/j ▶ Adultes : 100 à 200 mg/j
Cholestase hépatique	150 à 200 mg/kg/j (nourrissons)
Abétalipoprotéïnémie	50 à 100 mg/kg/j (adultes)
Insuffisance pancréatique, autre	A adapter individuellement

Quelques conseils



Respecter les doses prescrites.



Signaler la prise de ce traitement à l'ensemble des professionnels de santé.



N'arrêtez jamais brutalement votre traitement, la carence pourrait réapparaître.



Ne pas prendre ce traitement, si vous êtes intolérant au fructose ou si vous avez un syndrome de malabsorption du glucose et galactose ainsi qu'en cas de déficit en saccharase-isomaltase.



Si vous avez pris plus de Vitamine E que vous n'auriez dû, vous risquez d'avoir des effets indésirables tels que la diarrhée ou des douleurs abdominales. Informez en votre médecin



Si vous avez oublié de prendre votre Vitamine E, ne pas doubler la dose pour compenser celle oubliée. Continuez votre schéma posologique habituel.



Conservez le traitement à température ambiante. Après ouverture, le flacon devra être conservé au maximum 30 jours.



Conservez hors de la portée des enfants.

	Diarrhées	<p>Ne mangez pas de légumes, ni de fruits ni de laitage. Préférez les féculents : riz, carottes cuites, pain blanc. Buvez abondamment de petites quantités d'eau.</p> <p>Si ces symptômes persistent pendant plus de deux jours, parlez en à votre médecin afin de réévaluer la posologie.</p>
	Risque hémorragique chez les patients carencés en vitamine K	Informez votre médecin de la prise d'AVK et d'anticoagulants oraux
	Survenue de thromboses chez les personnes à risques	Informez votre médecin en cas d'antécédents

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.