

## ● Les associations dangereuses :




### Alcool

Un risque de surdosage  
**MORTEL**

### Les Benzodiazépines à forte dose :

Comme le Seresta®, le Xanax®,  
le Lexomil®  
**Mort par ARRÊT  
RESPIRATOIRE**



### La Méthadone

**&**

### Les autres dérivés de la Morphine®

(ex: Di-antalvic®, Efferalgan  
Codéiné®..)

**ETAT DE MANQUE**



## Quiz

1-Le mode d'utilisation le plus efficace est de faire fondre le comprimé sous la langue:

- Oui
- Non

2-Sniffer le Subutex® procure t-il plus effet?

- Oui
- Non

3-Au maximum, combien de temps l'ordonnance est-elle valable pour le Subutex®?

- 28 jours
- 2 mois
- 6 mois

4-Quelle est la durée d'action du Subutex®?

- 12h
- + de 24h
- 48h

5-Que ne doit-on pas associer avec le Subutex®?

- Seresta-Xanax®
- Héroïne
- Méthadone

6-Les associations Méthadone-Subutex® et Subutex® dérivés de la Morphine procurent elles?

- Un état de manque
- Un surdosage

# SUBUTEX®

tout savoir

+ d'efficacité  
- de danger

**N'hésitez pas à vous adresser au personnel soignant si vous avez des questions!!**



pharmacie de l'  
**UCSA**

Pôle Pharmacie  
**CHU DE CAEN**

# Pourquoi *le* Subutex ?

Le Subutex est un traitement médicamenteux.

Et non une drogue !!



**C'est le traitement de la dépendance à l'héroïne, la codéine, la morphine, rabla....**



**Il n'est pas efficace pour la cocaïne, ni pour le cannabis.**

Le générique est aussi efficace que le Subutex®.



**C'est un 1<sup>er</sup> pas positif vers une prise en charge.**



- **N'hésitez pas à demander de l'aide aux infirmières, aux médecins et au pharmacien.**

## • Comment est prescrit le Subutex®?

- **Après visite d'un médecin.**
- **Sur ordonnance uniquement.**
- **Pour une durée maximale de 28 jours.**
- **Il agit sur au moins 24h.**
- **On le prend en une seule prise par jour.**
- **Fractionner les prises rend le traitement moins efficace.**
- **C'est un traitement de longue durée.**




**L'arrêt est progressif JAMAIS BRUTAL!!**

Comme tout médicament, il peut occasionner des effets secondaires comme une somnolence, une constipation, des maux de tête.

## • Mode de prise :

- *Le bon mode de prise :*



**Laisser fondre le comprimé sous la langue** permet aux petits vaisseaux sanguins, situés sous la langue, de conduire le médicament directement au cerveau.



*Les mauvais modes de prises :*



**L'injection** du Subutex® engendre des risques d'abcès, d'embolies, d'infections, de SIDA, d'hépatites B et C.



**Sniffer** le Subutex®, diminue fortement l'efficacité du traitement et engendre des risques: d'hépatite C, de SIDA, d'infection des Sinus.



**Fumer**



**Avaler** le comprimé diminue fortement l'efficacité du traitement.

**TOUS CES MODES D'ADMINISTRATION OCCASIONNENT DES RISQUES PARFOIS MORTELS!!**