



Anticoagulant oral direct



Votre traitement :

en 1 prise :



en 2 prises :



en 2 prises :



Pourquoi le prendre ?

Ce médicament permet de **fluidifier le sang** pour éviter la formation d'un caillot.

Comment le prendre ?



Le médicament doit être pris **chaque jour à la même heure** avec un grand verre d'eau.

Le Xarelto® doit **obligatoirement être pris au moment du plus gros repas** de la journée pour une meilleure efficacité.

Conseils

- ✓ Signalez à tout professionnel de santé que vous prenez ce traitement,
- ✗ Ne prenez pas de nouveaux médicaments (même sans ordonnance ou à base de plantes) sans en informer votre médecin,
- ✗ N'arrêtez pas le médicament sans l'avis de votre médecin/pharmacien,
- ✗ Evitez les sports de contact ou potentiellement dangereux (football, rugby...).



PÔLE MÉDECINE
INTERNE ET
GÉRIATRIQUE



Unité sanitaire-dispositifs
soins somatiques

CHU
CAEN NORMANDIE

En cas d'oubli : NE PAS DOUBLER LA DOSE

- **Traitement en 2 prises** : prendre la dose oubliée dans la journée jusqu'à 6 heures avant la prise suivante et poursuivre son traitement comme habituellement.
- **Traitement en 1 prise** : prendre la dose oubliée dans la journée et poursuivre son traitement comme habituellement. Si la dose oubliée n'est pas prise dans la journée, « sauter » cette prise et prendre la suivante à l'heure habituelle le lendemain.

Signes d'un surdosage : risque hémorragique

- ▶ saignement des gencives ou du nez,
- ▶ oeil rouge,
- ▶ sang dans les urines et/ou les selles,
- ▶ apparition de « bleus » sans cause évidente,
- ▶ vomissements ou crachats sanglants,
- ▶ saignement qui ne s'arrête pas.



Si vous présenter un de ses signes, prévenez un médecin ou un(e) infirmier(e).

Signe d'un sous-dosage : risque de formation d'un caillot (AVC...)



Déformation de la bouche



Paralysie d'un côté du corps



Trouble de la parole et de la vision



URGENCE MEDICALE



La dose est fixe. Il n'y a pas de prise de sang de contrôle (TP, INR) à réaliser pour ajuster la dose contrairement aux autres AVK (Préviscan®, Coumadine®).