




Qu'est ce que WEGOVY® ?



En l'absence d'alternative thérapeutique disponible, **WEGOVY®** est indiqué en complément d'une alimentation équilibrée et d'une augmentation de l'activité physique dans le contrôle du poids, notamment pour la perte de poids et le maintien du poids, chez des adultes avec un indice de masse corporelle (IMC) initial $\geq 40\text{kg/m}^2$ (obésité de classe III ou obésité morbide) en présence d'au moins un facteur de comorbidité lié au poids : hypertension traitée, dyslipidémie traitée, maladie cardiovasculaire établie, syndrome d'apnée du sommeil appareillé.

Comment prendre ce médicament ?

WEGOVY® doit être administré **une fois par semaine**, le **même jour** chaque semaine. Votre médecin vous demandera d'augmenter votre dose toutes les quatre semaines. La dose initiale est de **0,25mg une fois par semaine pendant 4 semaines**, puis chaque mois vous augmenterez jusqu'à atteindre la dose recommandée de 2,4 mg par semaine.



WEGOVY® doit être administré par **injection sous-cutanée** (sous la peau).

Les meilleurs endroits pour réaliser vos injections sont le **haut du bras**, la **cuisse** ou le **ventre** (à distance de 5cm du nombril). **Alterner les sites d'injection**, ne pas piquer deux fois au même endroit.

Insérez l'aiguille dans votre peau, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de dose jusqu'à ce que le compteur de dose indique $>0<$. Maintenez la pression sur le bouton de dose avec l'aiguille dans votre peau et comptez lentement jusqu'à 6.

Conservation

- Avant ouverture, conserver au **réfrigérateur entre 2°C et 8°C**.
- Après ouverture, conserver 6 semaines à température ambiante ou au réfrigérateur.
- **Ne pas congeler**

Que faire en cas d'oubli ?

Si vous avez oublié d'injecter une dose :

- **dans les 3 jours qui suivent la date de l'injection oubliée** : injectez la dose dès que vous y pensez, puis injectez la dose suivante comme d'habitude, le jour prévu.
- **après les 3 jours qui suivent la date de l'injection oubliée** : ne pas injecter de dose et injectez la dose suivante comme d'habitude, le jour prévu. Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose oubliée.

Effets indésirables potentiels (les plus fréquents)

- Troubles gastro-intestinaux (nausées, diarrhées, constipation, vomissements)
- Perte d'appétit
- Douleur au point d'injection