

Guide d'entretien effets indésirables anticancéreux

Neuropathies périphériques

Détecter et surveiller l'apparition de neuropathies périphériques

Au niveau chronologique	<p>Depuis quand les symptômes ont-ils débuté ?</p> <ul style="list-style-type: none">• moins d'un mois (aigu)• entre 1 et 6 mois (subaigu)• plus de 6 mois (chronique)
Au niveau de la fréquence/localisation	<p>Est-ce que les symptômes s'aggravent ou restent stables ?</p>
	<p>Est-ce que les symptômes sont localisés ou diffus ?</p>
	<p>Est-ce que les symptômes symétriques ou asymétriques ?</p>
Au niveau de la sévérité	<p>Au cours de la semaine passée, avez-vous eu des douleurs lancinantes ou des brûlures dans les mains et/ou les pieds ?</p> <ul style="list-style-type: none">• Si oui : utiliser le questionnaire DN4
	<p>Au cours de la semaine passée, avez-vous eu des crampes dans les mains et/ou les pieds ?</p>
	<p>Au cours de la semaine passée, avez-vous eu des fourmillements au niveau des mains et/ou des pieds ?</p>
	<p>Au cours de la semaine passée, avez-vous des difficultés pour effectuer des gestes fins (tenir un crayon, lacer vos chaussures, boutonner une chemise ...) ?</p>
	<p>Au cours de la semaine passée, avez-vous eu une vision trouble, des difficultés à entendre ?</p>
	<p>Est-ce que ces symptômes vous gênent pour vos activités dans la vie quotidienne ?</p>
Au niveau des causes	<p>Avez-vous déjà eu ces symptômes auparavant ?</p>
	<p>Avez-vous des pathologies et/ou traitements ?</p>