



# CAPTOPRIL *sol buvable 25 mg/5 mL*

NOYADA®

## A quoi sert ce médicament ?

- Ce médicament contient la substance active Captopril qui est un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Il agit en permettant aux vaisseaux sanguins de se dilater pour que le cœur ait moins de difficulté à pomper le sang.
- Il est indiqué dans : l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, l'infarctus du myocarde, la maladie rénale du patient diabétique
- **Il est prescrit par un médecin**
- Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières sur présentation de votre ordonnance, de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle
- Solution limpide incolore
- Ne pas mettre au réfrigérateur. A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. **A utiliser dans les 21 jours après ouverture**



► Ne jetez pas les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien

## Comment prendre ce médicament ?


Quand ?

..... avant, pendant ou après un repas,  
environ à la même heure chaque jour

► La boîte contenant ce médicament contient une **seringue de dosage de 5 mL avec adaptateur** et un **godet doseur de 30 mL**



- **Seringue de 5 mL** : chaque trait de graduation numéroté (trait violet) correspond à 1 mL de solution équivalent à 5 mg de captopril. Les graduations intermédiaires correspondent à 0,2 mL de solution soit 1 mg de captopril



- **Gobelet doseur de 30 mL** : chaque trait de graduation numéroté correspond à 5 mL équivalent à 25 mg de captopril. Les graduations intermédiaires correspondent à 1 mL de solution soit 5 mg de captopril




1°) Ouvrez le flacon : enfoncez le bouchon et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre




2°) En tenant le flacon d'une main, prenez l'adaptateur en plastique de la seringue et insérez-le dans le flacon. Assurez-vous qu'il soit bien fixé




3°) Prenez la seringue et insérez-la dans l'adaptateur



4°) Remplissez la seringue avec une petite quantité de solution en tirant le piston vers le bas, puis poussez le piston vers le haut pour enlever le plus de bulles possible. Tirez le piston vers le bas jusqu'au trait de graduation correspondant à la quantité en millilitres (ml) prescrite par votre médecin



5°) Retournez le flacon à l'endroit. Retirez la seringue de l'adaptateur.



6°) Administrez le contenu de la seringue dans la bouche en poussant le piston jusqu'au fond de la seringue et assurez-vous que tout le médicament soit bien avalé

7°) Enlevez l'adaptateur du flacon et refermez le flacon avec le bouchon à vis en plastique. Après utilisation lavez l'adaptateur et la seringue ou le godet doseur

► Que faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

- **En cas d'oubli** : ne prenez pas de dose double pour compenser la dose oubliée. Prenez la dose suivante à l'horaire habituel
- **En cas de vomissement** : ne prenez pas de nouvelle dose. Poursuivez le traitement à l'heure habituelle, **sans la doubler**.

## Interactions avec d'autres médicaments ou votre alimentation



Des interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables, Communiquez bien l'ensemble de vos traitements à votre médecin et votre pharmacien à chaque nouvelle prescription



- Traitement contre-indiqué pendant la grossesse
- Interrompez l'allaitement durant le traitement

## Quels effets indésirables peuvent survenir avec NOYADA® Captopril ?

Troubles du sommeil, altération du goût, sensations vertigineuses, toux sèche et irritative, dyspnée, nausées, vomissements, irritations gastriques, douleurs abdominales, diarrhée, constipation, sécheresse buccale, etc.



Seuls certains effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien



Pensez à faire pratiquer les examens biologiques prescrits par votre médecin

## Que faire en cas de survenue d'effets indésirables ?

► Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

**Arrêtez de prendre NOYADA® et contactez rapidement votre médecin** en cas de :

- Gonflement des mains, du visage, des lèvres ou de la langue
- Respiration sifflante ou difficulté à respirer
- Ulcères, éruption bulleuse ou brûlure, peau rouge, décollement de la peau au niveau des lèvres, de la langue et des organes génitaux, pouvant s'étendre aux yeux, au visage et au corps
- Maux de gorge ou fièvre
- Etourdissements graves ou évanouissements
- Douleur thoracique qui s'étend jusqu'au bras gauche
- Respiration rapide et profonde, peau moite et froide, sensation d'anxiété
- Douleurs d'estomac
- Jaunissement de la peau et/ou des yeux

**Contacts utiles :**

---



---

**Fiche remise le :**

---



---