



# ELVANSE®

► Lisdexamfetamine dimésylate

## À quoi sert ce médicament ?

- ELVANSE contient la substance active dimésylate de lisdexamfétamine, qui **stimule l'activité du cerveau**. Il contribue à **améliorer l'attention et la concentration** et à **diminuer l'impulsivité**.
- C'est un médicament à longue durée d'action qui agit progressivement pendant une période de 13h.
- ELVANSE est indiqué dans le cadre d'une prise en charge globale du « trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité » (TDAH)

**Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières sur présentation de votre ordonnance, de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle.**

Gélule dosée à :

- **20 mg** : corps opaque ivoire et coiffe opaque ivoire avec les mentions « S489 » et « 20 mg » imprimées à l'encre noire
- **30 mg** : corps opaque blanc et coiffe opaque rose avec les mentions « S489 » et « 30 mg » imprimées à l'encre noire
- **40 mg** : corps opaque blanc et coiffe opaque bleu-vert avec les mentions « S489 » et « 40 mg » imprimées à l'encre noire
- **50 mg** : corps opaque blanc et coiffe opaque bleue avec les mentions « S489 » et « 50 mg » imprimées à l'encre noire



► À conserver à une température ne dépassant pas 25°C, dans un lieu de stockage sûr, inaccessible à d'autres personnes



► **Ne jetez pas** les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien

## Comment prendre ce médicament ?

<b>Quand ?</b>	<b>1 prise le matin avant le petit-déjeuner. ELVANSE peut être pris au cours ou en dehors des repas</b>
<b>Comment ?</b>	Il y a deux façons de prendre ELVANSE : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Avaler la gélule entière un verre d'eau.</b></li> <li>• <b>Ouvrir la gélule et verser le contenu dans :</b> un aliment semi-liquide tel qu'un yaourt ; un verre d'eau ou de jus d'orange. Utilisez une cuillère pour briser les petits morceaux de poudre et mélanger complètement ELVANSE avec le yaourt, l'eau ou le jus d'orange. Ingérez en totalité le yaourt, l'eau ou le jus d'orange immédiatement après les avoir mélangés avec ELVANSE. Ne conservez pas le mélange. Ne vous inquiétez pas s'il reste ensuite un film dans le verre ou le pot, ce n'est pas la substance active.</li> </ul>

- Que faire en cas d'oubli ou de vomissement ?
- **En cas d'oubli**, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle le lendemain matin, sans la doubler. Evitez de prendre la dose l'après-midi en raison du risque d'insomnie.
- **En cas de vomissement**, ne prenez pas de nouvelle dose. La dose suivante sera prise à l'heure habituelle le lendemain matin, sans la doubler. Evitez de prendre la dose l'après-midi en raison du risque d'insomnie.

## Quelques conseils



Des interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables, Communiquez bien l'ensemble de vos traitements à votre médecin et votre pharmacien à chaque nouvelle prescription



- Traitement contre-indiqué pendant la grossesse
- Interrompez l'allaitement durant le traitement

# Quels effets indésirables peuvent survenir avec ELVANSE® ?

Comme tous les médicaments, ELVANSE® peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables		Prévention
	Nausées, vomissements, douleur abdominale, diminution de l'appétit	Fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers et mangez lentement. Evitez les aliments gras, frits et épicés, et ceux dont l'odeur peut déclencher les nausées. Evitez de rester l'estomac vide, cela accentue les nausées. Buvez plutôt entre les repas. Utilisez les médicaments antiémétiques qui vous ont été prescrits le cas échéant.
	Maux de tête, fatigue	Privilégiez une alimentation saine. Limitez l'usage de psychostimulants (ex : café, tabac et alcool). Soyez prudent en cas de conduite automobile. Respectez des temps de repos dans la journée en conservant une activité même modérée. Couchez-vous à heure régulière et dormez suffisamment la nuit.
	Insomnie	Privilégiez une alimentation saine. Limitez l'usage de psychostimulants (ex : café, tabac et alcool).. Respectez des temps de repos dans la journée en conservant une activité même modérée. Couchez-vous à heure régulière et dormez suffisamment la nuit
	Perte de poids	Surveillez régulièrement votre poids.
	Palpitations Douleurs thoraciques	Consultez immédiatement un médecin

*Des sensations vertigineuses, une irritabilité, une agressivité, une nervosité, une élévation de la pression artérielle,... peuvent également survenir avec ELVANSE*

 Seuls certains effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien

## Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

► Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv.fr](http://signalement-sante-gouv.fr)

**Contactez rapidement votre médecin** en cas de d'effet indésirable persistant ou s'aggravant 

## Quels sont les examens que le médecin effectuera après le début du traitement?

- Contrôle de l'**appétit**
- Mesure de la **taille** et du **poids**
- Mesure de la **pression artérielle** et de la **fréquence cardiaque**
- Evaluation d'éventuels **problèmes d'humeur, d'état d'esprit** ou **d'autres sentiments inhabituels** ou de leur **aggravation** pendant le traitement par ELVANSE

Fiche remise le :