



CRESEMBA® gél

► Isavuconazole

À quoi sert ce médicament ?

- Médicament **antifongique** qui contient une substance active appelée isavuconazole.
- Isavuconazole agit en **tuant ou en arrêtant** la **croissance** du **champignon à l'origine de l'infection**.
- CRESEMBA est utilisé chez les patients âgés de 1 an et plus pour traiter les infections fongiques suivantes :
 - **aspergillose invasive** causée par un champignon de la classe des Aspergillus ;
 - **mucormycose**, due à un champignon appartenant au groupe des Mucorales chez des patients pour lesquels un traitement par amphotéricine B n'est pas adapté.

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières sur présentation de votre ordonnance, de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle.

Gélule dosée à 100 mg de couleur orange suédois (brun rougeâtre) portant la mention « 100 » en encre noire sur la tête de la gélule



► À conserver à une température ne dépassant pas 30°C



► **Ne jetez pas** les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien

Comment prendre ce médicament ?

Quand ?	Les 2 premiers jours :h..... ;.....h.....et.....h..... = 3 prises par jour, à heures fixes (toutes les 8h), pendant ou en dehors des repas
	Après les 2 premiers jours :h..... = 1 prise par jour pendant ou en dehors des repas
Comment ?	Avalez les comprimés, avec de l'eau, chaque jour au même moment de la journée. Ne pas mâcher, ni couper, ni écraser, ni dissoudre.

► Que faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

- **En cas d'oubli** : prenez les gélules dès que vous y pensez. Toutefois, s'il est presque l'heure de prendre la dose suivante, sautez la dose oubliée. **Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.**
- **En cas de vomissement** : ne prenez pas de nouvelle dose. Poursuivez le traitement à l'heure habituelle, **sans la doubler.**

Interactions avec d'autres médicaments ou votre alimentation



Des interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables, Communiquez bien l'ensemble de vos traitements à votre médecin et votre pharmacien à chaque nouvelle prescription.



- Traitement contre-indiqué pendant la grossesse
- Interrompez l'allaitement durant le traitement

Quels effets indésirables peuvent survenir avec CRESEMBA® ?

Comme tous les médicaments, CRESEMBA® peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables	Prévention
 <p>Nausées, vomissements, diarrhée et/ou douleur abdominale</p>	Surveillez votre poids et pensez à bien vous hydrater (1,5 à 2L d'eau/jour. En cas de diarrhée , privilégiez une alimentation pauvre en fibres (féculents, carotte, banane...). Evitez certains aliments qui peuvent stimuler le transit intestinal (laitages, fruits-légumes crus, céréales, aliments gras, épices). En cas de nausées/vomissements , fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers et mangez lentement. Evitez les aliments gras, frits et épicés, et ceux dont l'odeur peut déclencher les nausées. Evitez de rester l'estomac vide, cela accentue les nausées. Buvez plutôt entre les repas. Utilisez les médicaments antiémétiques qui vous ont été prescrits le cas échéant.
 <p>Eruption cutanée</p>	Utilisez un gel ou pain dermatologique sans savon. Evitez l'eau chaude. Séchez par tamponnement. Appliquez un agent hydratant (crème ou lait). Evitez les expositions au soleil, surtout entre 12h et 16h. Portez des vêtements protecteurs, même sous un parasol (réflexion des UVA). Utilisez une protection cutanée d'indice ≥ 50 , à appliquer 30 min avant exposition et à renouveler toutes les 2h.
 <p>Démangeaisons cutanées</p>	Appliquez des compresses froides sur les zones concernées (ne pas appliquer de lotions alcoolisées). Privilégiez les vêtements en coton amples et légers. Utilisez un gel ou pain dermatologique sans savon. Evitez l'eau chaude. Séchez par tamponnement. Appliquez un agent hydratant (crème ou lait). Coupez vos ongles courts (préférez la lime au coupe-ongles).
 <p>Maux de tête, fatigue</p>	Buvez suffisamment (1,5 à 2L d'eau/jour) et privilégiez une alimentation saine, à heures régulières. Limitez l'usage de psychostimulants (ex : café, tabac et alcool). Respectez des temps de repos dans la journée en conservant une activité même modérée. Couchez-vous à heure régulière ; évitez les couchers tardifs, les grasses matinées. Soyez prudent en cas de conduite automobile.

* Les effets indésirables les plus fréquents



Seuls certains effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien

Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

► Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

Contactez rapidement votre médecin en cas de d'effet indésirable persistant ou s'aggravant



Fiche remise le :
