

PRIMAQUINE 15 mg comprimé



FICHE
CONSEIL

Patient

A quoi sert ce médicament ?

- Ce médicament est un **antipaludique**. Il est notamment utilisé pour traiter les infections à *Plasmodium vivax* et *Plasmodium ovale*, parasites responsables du **paludisme**.
- Ce médicament est réservé aux adultes, ainsi qu'aux enfants et adolescents de 50kg et plus.
- **Il est prescrit par un médecin hospitalier,**
- Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières sur présentation de votre ordonnance, de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle.



► Ne jetez pas les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien

Comment prendre ce médicament ?

Quand ?	2 comprimés en une prise par jour
Comment ?	Avalez les comprimés, avec de l'eau, chaque jour au même moment de la journée. A prendre pendant un repas.

► Que faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

- **En cas d'oubli** : prenez la dose oubliée dès que possible, puis prenez la dose suivante au moment prescrit. **Ne doublez pas la dose pour compenser une dose oubliée.**
- **En cas de vomissement** : ne prenez pas de nouvelle dose. Poursuivez le traitement à l'heure habituelle, **sans la doubler.**
- **N'arrêtez pas le traitement** sans en parler à votre médecin. Pour une guérison complète, il est important de terminer le traitement prescrit par votre médecin.

Interactions avec d'autres médicaments ou votre alimentation



Des interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables, Communiquez bien l'ensemble de vos traitements à votre médecin et votre pharmacien à chaque nouvelle prescription

► Une **méthode de contraception efficace pour les hommes comme pour les femmes**, doit être utilisée **pendant toute la durée du traitement et doit être poursuivi 3 mois après la fin du traitement.**



► Traitement contre-indiqué pendant la grossesse. Un test de grossesse sera prescrit avant l'introduction du traitement.

► L'allaitement est contre-indiqué durant toute la durée du traitement.

Quels effets indésirables peuvent survenir avec PRIMAQUINE ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Diminution des globules blancs
- Diminution des globules rouges pouvant provoquer une pâleur, un essoufflement, une fatigue, des étourdissements et des urines foncées.
- Augmentation de la méthémoglobinémie (une forme anormale d'hémoglobine dans le sang.
- Trouble du rythme cardiaque (allongement de l'intervalle QT).
- Nausées
- Vomissements
- Douleurs et crampes d'estomac
- Douleurs et crampes abdominales
- Sensation vertigineuse
- Éruption sur la peau, démangeaisons

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre infirmier/ère.



Seuls certains effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien



Pensez à faire pratiquer les examens biologiques (bilans hématologiques) prescrits par votre médecin

Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

► Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

Cessez immédiatement de prendre PRIMAQUINE et contactez rapidement votre médecin en cas de signes d'anémie hémolytique suivants :

- Urines foncées
- Pâleur
- Essoufflement
- Étourdissements
- Fatigue



Contacts utiles :

Fiche remise le :

