



# FUMAGILLINE, susp buv

► Préparation magistrale

## À quoi sert ce médicament ?

- Traitement des **diarrhées sévères** dues à une **microsporidiose intestinale** à *Enterocytozoon bienewisi*

**Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières sur présentation de votre ordonnance, de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle.**



Suspension buvable dosée à 20 mg/ml, dans un flacon ambré rempli à 25 ml (quantité suffisante pour une posologie de 20 mg 3 fois/jour pendant 7 jours)



- À conserver **7 jours** à une température réfrigérée comprise **entre 2 et 8°C**



- **Ne jetez pas** les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien

## Comment prendre ce médicament ?

Quand ?	.....h..... ;.....h.....et.....h..... = 3 prises par jour, en dehors des repas
Comment ?	Prélever 1 ml par prise, dans le flacon

- Se reporter à la **notice d'utilisation**

## Interactions avec d'autres médicaments ou votre alimentation



Des interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables, Communiquez bien l'ensemble de vos traitements à votre médecin et votre pharmacien à chaque nouvelle prescription.



- Traitement contre-indiqué pendant la grossesse
- Interrompez l'allaitement durant le traitement

# Quels effets indésirables peuvent survenir avec CRESEMBA® ?

Comme tous les médicaments, CRESEMBA® peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables	Prévention
 <p>Nausées, vomissements, diarrhée et/ou douleur abdominale</p>	Surveillez votre poids et pensez à bien vous hydrater (1,5 à 2L d'eau/jour. <b>En cas de diarrhée</b> , privilégiez une alimentation pauvre en fibres (féculents, carotte, banane...). Evitez certains aliments qui peuvent stimuler le transit intestinal (laitages, fruits-légumes crus, céréales, aliments gras, épices). <b>En cas de nausées/vomissements</b> , fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers et mangez lentement. Evitez les aliments gras, frits et épicés, et ceux dont l'odeur peut déclencher les nausées. Evitez de rester l'estomac vide, cela accentue les nausées. Buvez plutôt entre les repas. Utilisez les médicaments antiémétiques qui vous ont été prescrits le cas échéant.
 <p>Eruption cutanée</p>	Utilisez un gel ou pain dermatologique sans savon. Evitez l'eau chaude. Séchez par tamponnement. Appliquez un agent hydratant (crème ou lait). Evitez les expositions au soleil, surtout entre 12h et 16h. Portez des vêtements protecteurs, même sous un parasol (réflexion des UVA). Utilisez une protection cutanée d'indice $\geq 50$ , à appliquer 30 min avant exposition et à renouveler toutes les 2h.
 <p>Démangeaisons cutanées</p>	Appliquez des compresses froides sur les zones concernées (ne pas appliquer de lotions alcoolisées). Privilégiez les vêtements en coton amples et légers. Utilisez un gel ou pain dermatologique sans savon. Evitez l'eau chaude. Séchez par tamponnement. Appliquez un agent hydratant (crème ou lait). Coupez vos ongles courts (préférez la lime au coupe-ongles).
 <p>Baisse des globules rouges et des plaquettes</p>	Pensez à faire pratiquer les examens biologiques prescrits par votre médecin.
 <p>Difficultés à respirer (toux, essoufflement)</p>	Faites des exercices de respiration abdominale et de relaxation (sophrologie, yoga, tai-chi). Ménagez-vous en planifiant vos activités du quotidien. Evitez les facteurs qui peuvent déclencher un essoufflement (tabac, parfum, poils d'animaux...). Consultez votre médecin en cas de symptômes persistants, de douleurs thoraciques ou de fièvre.

\* Les effets indésirables les plus fréquents



Seuls certains effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien

## Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

► Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv.fr](http://signalement-sante-gouv.fr)

**Contactez rapidement votre médecin** en cas de d'effet indésirable persistant ou s'aggravant



Fiche remise le :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_