



PETINIMID[®] cps

► Ethosuximide

À quoi sert ce médicament ?

- Médicament **antiépileptique** qui contient une substance activé appelée ethosuximide.
- Il est destiné à traiter les crises d'épilepsies généralisées.

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières sur présentation de votre ordonnance, de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle.

- Couleur ivoire, capsule molle oblongue en gélatine.



► À conserver à une température ne dépassant pas 25°C, à l'abri de la lumière



► **Ne jetez pas** les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien

Comment prendre ce médicament ?

| | |
|-----------|--|
| Quand ? |h..... ,h.....,h..... (2 à 3 prises / jour) |
| Comment ? | Avalez les capsules molles sans les croquer avec un peu d'eau durant les repas |

► Que faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

- **En cas d'oubli** : la dose suivante doit être prise comme prévu. Il ne faut pas prendre une double dose.
- **En cas de vomissement** : ne pas prendre de nouvelle dose. Poursuivre le traitement à l'heure habituelle, sans la doubler.

Quelques conseils

- Les changements de doses doivent être progressifs
- N'arrêtez pas le traitement brutalement

Interactions avec d'autres médicaments ou votre alimentation



Des interactions avec d'autres médicaments peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables, Communiquez bien l'ensemble de vos traitements à votre médecin et votre pharmacien à chaque nouvelle prescription.



- Traitement non recommandé pendant la grossesse
- L'allaitement n'est pas recommandé durant le traitement

Quels effets indésirables peuvent survenir avec PETINIMID® ?

Comme tous les médicaments, PETINIMID® peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

| Effets indésirables | Prévention |
|--|--|
|  Réactions allergiques, urticaire | Utilisez un gel ou pain dermatologique sans savon. Evitez l'eau chaude. Séchez par tamponnement. Appliquez un agent hydratant (crème ou lait). |
|  Affection oculaire : vision floue de loin | Parlez-en à votre médecin. |
|  Baisse des globules blancs | Des examens biologiques doivent être pratiqués mensuellement pendant la première année de traitement, puis tous les six mois |



Seuls certains effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien

Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

► Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

Contactez rapidement votre médecin en cas de d'effet indésirable persistant ou s'aggravant



Fiche remise le :

