



FIRAZYR®

► Icatibant

À quoi sert ce médicament ?

- FIRAZYR est indiqué dans le traitement des **crises aiguës d'angio-œdème héréditaire (AOH)** chez l'adulte, l'adolescent, et les enfants âgés de 2 ans et plus, ayant une carence en inhibiteur de la C1 estérase.

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières sur présentation de votre ordonnance, de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle.

- Solution injectable à **30 mg** (transparente et incolore) : Seringue préremplie de 3 ml + 1 aiguille hypodermique, boîte unitaire.



► À conserver à une température ne dépassant pas 30°C, dans un lieu de stockage sûr, inaccessible à d'autres personnes. Ne pas congeler.



► **Ne jetez pas** les doses inutilisées / périmées, merci de les rapporter à votre pharmacien.

Comment prendre ce médicament ?

Quand ?	En cas de crise d'angio-œdème.
Comment ?	1 injection sous cutanée de préférence dans la région abdominale. A injecter lentement.

Quelques conseils

La décision de recourir à l'administration d'icaticbant par un soignant ou à l'auto-administration ne doit être prise que par un médecin expérimenté dans le diagnostic et le traitement de l'angio-œdème héréditaire.

Le médicament doit être efficace dans les **30 min.**

En cas de soulagement insuffisant ou de récurrence des symptômes après une auto-administration ou l'administration par un soignant, il est recommandé que le patient ou le soignant consulte un médecin.

Chez les adultes, les doses suivantes qui peuvent être nécessaires pour la même crise doivent être administrées au sein d'un établissement médical.

Préparation :

- Nettoyez le plan de travail (la surface) utilisé avant de commencer.
- Lavez-vous les mains à l'eau et au savon.
- Ouvrez la plaquette en tirant sur le film protecteur.
- Retirez la seringue préremplie de la plaquette.
- Retirez le capuchon situé à l'extrémité de la seringue préremplie en dévissant celui-ci.
- Une fois le capuchon retiré, posez la seringue préremplie sur une surface plane.



- ▶ L'icatibant ne doit être utilisé pendant la grossesse que si le bénéfice escompté justifie le risque potentiel pour le fœtus.
- ▶ il est recommandé aux femmes allaitantes souhaitant prendre Icatibant de ne pas allaiter pendant les 12 heures qui suivent l'administration du traitement.

Quels effets indésirables peuvent survenir avec FIRAZYR® ?

Comme tous les médicaments, FIRAZYR® peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables		Prévention
	Sensations vertigineuses, céphalées, nausées	Pensez à bien vous hydrater. Evitez de rester l'estomac vide, cela accentue les nausées. Ne vous allongez pas dans les 30 min suivant un repas.
	Rash, érythème, prurit, urticaire, réaction au site d'injection (ecchymose, brûlure, engourdissement, gonflement)	Appliquez des compresses froides sur les zones concernées (ne pas appliquer de lotions alcoolisées). Privilégiez les vêtements en coton amples et légers. Utilisez un gel ou pain dermatologique sans savon. Evitez l'eau chaude. Séchez par tamponnement. Appliquez un agent hydratant (crème ou lait).
	Fièvre	Contactez votre médecin.



Seuls certains effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien

Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

- ▶ Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

Contactez rapidement votre médecin en cas de d'effet indésirable persistant ou s'aggravant



Fiche remise le :

