



ISONIAZIDE

PDP-ISONIAZIDE®

A quoi sert ce médicament ?

- Ce médicament est utilisé en **prévention et traitement de la tuberculose chez les patients ne pouvant avaler les comprimés.**
- Il est prescrit par un **médecin hospitalier.**

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières sur présentation de votre ordonnance, de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle.



Solution buvable dosée à 10 mg/mL, le flacon contient 500 mL de solution.



► Ne jetez pas les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien.

Comment prendre ce médicament ?

Quand ?	1 prise par jour, la dose dépend du poids du patient.
Comment ?	A prendre chaque jour au même moment de la journée, de préférence à distance des repas (1h avant ou 2h après). Une seringue vous sera fournie pour prélever la bonne dose.

► Que faire en cas d'oubli ?

- **En cas d'oubli :** prenez la dose oubliée dès que possible. **Ne doublez pas la dose pour compenser une dose oubliée.**
- N'arrêtez jamais le traitement sans avis médical, même si vous vous sentez mieux.

Interactions avec d'autres médicaments ou votre alimentation



Des interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables.

Communiquez bien l'ensemble de vos traitements à votre médecin et votre pharmacien à chaque nouvelle prescription notamment si vous prenez des corticoïdes ou des médicaments contre les brûlures d'estomac.

► Il est possible d'utiliser l'isoniazide quel que soit le terme de la grossesse.
L'administration de vitamine B6 est recommandée.

► L'allaitement est déconseillé lors de l'utilisation d'isoniazide.

Quels effets indésirables peuvent survenir avec PDP-ISONIAZIDE® Isoniazide?

Effets indésirables	Prévention
 Nausées, vomissements, perte d'appétit	Essayez de manger par petites quantités et lentement, évitez les repas trop riches et trop copieux. Si ces signes persistent, parlez-en à votre médecin.
 Engourdissements, picotements, brûlures dans les mains et les pieds	Parlez-en à votre médecin.
 Yeux et peau jaunes, urine foncée, fièvre, fatigue, douleurs abdominales	Cela peut être le signe d'un problème au niveau du foie. Informez votre médecin.
 Vision trouble, perte de vision	Consultez votre médecin.
 Eruption cutanée	Cela peut être le signe d'une réaction allergique. Informez immédiatement votre médecin.

 Seuls certains effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

 Pensez à faire pratiquer les examens biologiques (**bilan hépatique**) prescrits par votre médecin.

Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

► Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

Contactez rapidement votre médecin en cas de :

- Engourdissements, picotements, brûlures dans les mains et les pieds
- Vision trouble, perte de vision
- Éruptions cutanées et de la fièvre
- Yeux et peau jaunes, urines foncées et de la fièvre
- Tout effet indésirable persistant ou s'aggravant



Contacts utiles :

Fiche remise le :

