

DIFICLIR ®

► Fidaxomicine



Patient

À quoi sert ce médicament ?

- Fidaxomicine DIFICLIR ® est un antibiotique indiqué chez les adultes et les enfants pour les diarrhées associées à une bactérie (*Clostridioides difficile*)

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières sur présentation de votre ordonnance, de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle.



Comprimé pelliculé de couleur blanche avec les inscriptions « FDX » et « 200 »
Boîte de 20 comprimés sous plaquettes thermoformées



- Conservation inférieure à 30°C, ne pas congeler, à l'abri de la lumière



- **Lavez-vous** soigneusement les mains avec un savon doux liquide **avant les repas et après le passage aux toilettes**



- **Ne jetez pas** les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien

Comment prendre ce médicament ?

Quand ?	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Schéma standard</u> : 1 comprimé deux fois par jour (toutes les 12 heures) pendant 10 jours ➤ <u>Schéma prolongé-pulsé</u> : 1 comprimé deux fois par jours de J1 à J5 (pas de prise de comprimé le jour 6) puis 1 comprimé 1 fois tous les deux jours de J7 à J25
Comment ?	Administration par voie orale, comprimé à avaler entier avec de l'eau au cours ou en dehors des repas

Interactions avec d'autres médicaments ou votre alimentation



Des interactions avec d'autres médicaments peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables

Communiquez bien l'ensemble de vos traitements à votre médecin et votre pharmacien à chaque nouvelle prescription



- **Grossesse** : éviter l'utilisation pendant la grossesse
- **Allaitement** : interrompre l'allaitement durant le traitement

Quels effets indésirables peuvent survenir avec DIFICLIR® ?

Comme tous les médicaments, DIFICLIR® peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables les plus fréquents	Prévention
 Rash, prurit	Utilisez un gel ou pain dermatologique sans savon. Evitez l'eau chaude. Séchez par tamponnement. Appliquez un agent hydratant (crème ou lait). Appliquez des compresses froides sur les zones concernées (ne pas appliquer de lotions alcoolisées). Privilégiez les vêtements en coton amples et légers.
 Etourdissements, céphalées	Evitez la consommation d'excitants (café, alcool, tabac). En cas de vertiges, reposez-vous au calme et décomposez vos mouvements. Consultez votre médecin en cas de vertiges persistants, de maux de tête inhabituels, de bourdonnements d'oreille ou de vomissements. Pensez à bien vous hydrater.
 Météorisme abdominal, flatulences, diminution de l'appétit, constipation	Buvez au moins 1,5L d'eau/jour. Privilégiez une alimentation riche en fibres (son, céréales, pain complet, légumes verts, fruits et fruits secs). Pratiquez une activité physique régulière. Surveillez la reprise du transit.
 Bouche sèche	Evitez les atmosphères sèches, les lieux enfumés et la consommation de tabac. Buvez régulièrement de l'eau, limitez la caféine. Hydratez-vous régulièrement les lèvres et maintenez une bonne hygiène buccale.

 Seuls certains effets indésirables sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien

Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

- Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

Contactez rapidement votre médecin en cas de d'effet indésirable persistant ou s'aggravant



Fiche remise le :

