



ANZUPGO® 20mg/g

► Delgocitinib

À quoi sert ce médicament ?

- C'est un traitement de l'eczéma chronique des mains modéré à sévère chez les adultes pour lesquels les dermocorticoïdes sont inadéquats ou inappropriés.
- Il est prescrit par un médecin dermatologue ou allergologue.

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies de ville sur présentation de votre ordonnance, de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle.



Crème pour application cutanée de couleur blanche à légèrement brune en tube de 60g.



► À conserver à **température ambiante 1 an maximum après ouverture** (noter la date d'ouverture sur le tube afin de ne pas l'oublier) .



► **Ne jetez pas** les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien

Comment prendre ce médicament ?

Administration

- ❖ La crème est réservée à **une administration par voie cutanée**
- ❖ En fine couche **2 fois par jour** sur la peau affectée des mains et des poignets
- ❖ Jusqu'à ce que la peau ne présente aucune lésion ou presque aucune lésion
- ❖ Respecter un intervalle **minimum de 12 heures** entre 2 applications

En cas d'oubli

- ❖ Si l'application d'une dose a été oubliée, la crème doit être appliquée dès que possible.

À remplir avec l'aide d'un professionnel de santé.



Renseigné avec selon l'ordonnance du/...../.....

Application :

Respecter 12 heures d'intervalle entre les deux prises



Matin :
.....h.....



Soir :
.....h.....

*N'arrêtez jamais ou ne modifiez jamais votre traitement sans l'avis de votre médecin.
Cette fiche n'est pas une ordonnance, respectez les consignes d'utilisation de votre médecin.*

En cas de réapparition des signes et symptômes, le traitement deux fois par jour des zones affectées doit être repris selon les besoins.

Quelques conseils ☺



- Ne pas laver la peau traitée **pendant au moins 2 heures** après l'application de la crème.
- Si une autre personne applique la crème, elle doit se laver les mains après application.
- Le contact avec les yeux, la bouche ou d'autres muqueuses doit être évité. En cas d'exposition accidentelle sur les yeux ou les muqueuses, **essuyez la crème et rincez avec de l'eau**.

Interactions avec d'autres médicaments ou votre alimentation



Il n'est pas recommandé d'utiliser de façon concomitante d'autres traitements par voie cutanée sur les mêmes zones d'application de l'ANZUPGO®.

N'appliquez rien dans les 2h après l'application d'ANZUPGO®. (S'applique également aux émollients et crèmes solaires).



- ❖ L'ANZUPGO® n'est pas recommandé pendant la grossesse.
- ❖ En cas de désir de grossesse, parlez-en avec votre médecin.
- ❖ L'allaitement est possible pendant la durée du traitement.

Quels effets indésirables peuvent survenir avec ANZUPGO® ?

Comme tous les médicaments, ANZUPGO® peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables



Réactions au site d'application (prurit, érythème, paresthésie ou douleur)*

Prévention

Parlez-en à votre médecin

* Les effets indésirables les plus fréquents



Seuls certains effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien

Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

► Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)



Contactez rapidement votre médecin en cas de d'effet indésirable persistant ou s'aggravant

Fiche remise le :

Élaboré par A. David, interne
Validé par Dr A. Lecardonnel, pharmacien et Dr A. Adelman dermatologue

