

ANZUPGO® 20mg/g

► Delgocitinib

1. Indications thérapeutique et mécanisme d'action

- L'ANZUPGO est le traitement de 2^{ème} ligne, soit après échec, soit après intolérance ou contre-indication aux dermocorticoïdes.
- Indication : Eczéma chronique des mains (ECM) modéré à sévère chez les adultes.
- Mécanisme d'action : Inhibiteur de Janus Kinases (JAK) ciblant l'activité des quatre membres de la famille des enzymes JAK (JAK1, JAK2, JAK3 et TYK2)

2. Présentations, caractéristiques et excipients

- Crème pour application cutanée de couleur blanche à légèrement brune en tube de 60g
- Excipients à effet notoire : 10mg d'alcool benzylique (E 1519), 0,2 mg de butylhydroxyanisole (E 320) et 72mg d'alcool cétostéarylique.



3. Conditions de prescription et délivrance

- Prescription réservée aux dermatologues ou allergologues
- Médicament disponible dans les pharmacies de ville
- Statut : Anciennement accès direct (début le 24/05/2025 – Fin le 04/02/2026)
- Prix : 547,82 € (TTC) avec taux de participation de l'assuré de 35%

4. Posologie et mode d'administration

Dose et administration	<ul style="list-style-type: none"> La crème est réservée à une administration par voie cutanée Application en fine couche 2 fois par jour sur la peau affectée des mains et des poignets Jusqu'à ce que la peau ne présente aucune lésion ou presque aucune lésion Respecter un intervalle minimum de 12 heures entre 2 applications
Comment ?	Appliquer une fine couche de crème 2 fois par jour (intervalle de minimum 8h entre les 2 applications) dans les zones dépigmentées de la peau.

5. Effets indésirables

Effets indésirables	Réactions au site d'application : Prurit, érythème, paresthésie ou douleur	
---------------------	--	--

Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

6. Recommandations

- L'ANZUPGO® n'est pas recommandé pendant la grossesse.
- En cas de désir de grossesse, parlez-en avec votre médecin.
- L'allaitement est possible pendant la durée du traitement.
- Pendant l'allaitement, éviter tout contact direct avec le nourrisson et sur le mamelon ou zone environnante.
- Un examen régulier de la peau au site d'application est recommandé : cas de cancer cutané non-mélanome.

7. Précautions d'emploi

Il n'est pas recommandé d'utiliser de façon concomitante d'autres traitements par voie cutanée sur les mêmes zones d'application de l'ANZUPGO®. Il ne faut rien appliquer dans les 2h après l'application d'ANZUPGO® (s'applique également aux émollients et crèmes solaires).

8. Conseils à destination des patients

- Ne pas laver la peau traitée pendant **au moins 2 heures** après l'application de la crème.
- Si une autre personne applique la crème, elle doit se laver les mains après application.
- Eviter le contact avec les yeux, la bouche ou d'autres muqueuses. En cas d'exposition accidentelle des yeux ou des muqueuses, **essuyez la crème immédiatement et rincer avec de l'eau**
- À conserver à **température ambiante 1 an maximum après ouverture** et noter la date d'ouverture sur le tube

9. AUTRES TRAITEMENTS ACTUELS

- Topiques : dermocorticoïdes (traitement de première ligne)
- Inhibiteurs topiques de la calcineurine, Acide salicylique en préparation 2 à 30%
- Rétinoïdes : topiques ou comprimés (Alitrétinoïne)
- Biothérapie : Dupilumab
- Emollients quotidiens, douches tièdes courtes, vêtements en coton...