



IMCIVREE® sol inj

► Setmélanotide

À quoi sert ce médicament ?

- IMCIVREE agit en contrôlant la faim dans le traitement de l'obésité hypothalamique d'origine lésionnelle, chez les adultes et les enfants.
- Prescrit et renouvelé par votre médecin hospitalier spécialiste en endocrinologie, diabétologie, nutrition ou pédiatrie

Médicament disponible dans les pharmacies hospitalières ou pharmacies de ville, selon l'indication, sur présentation de votre ordonnance

Solution injectable dosée à **10 mg/mL** (flacon multidose de 1mL)

Kit d'injection pour 3 mois contenant les seringues avec aiguilles, la fiche de conversion, le container Déchets de Soins à Risque Infectieux (DASRI) et les compresses imprégnées d'alcool



- Avant **ouverture** à conserver au **réfrigérateur** (entre 2 et 8°C) dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière.
- Après la première ouverture : conservation pendant **30 jours** au réfrigérateur ou à température ambiante (<30°C), dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière.



- **Ne jetez pas** les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien.

Comment prendre ce médicament ?


Quand ?

1 prise par jour : en début de journée (pour maximiser la réduction de la faim durant la journée), indépendamment des repas.

- Sortez le flacon du réfrigérateur 15 minutes avant l'injection ou réchauffer le produit avant de l'utiliser en faisant doucement rouler le flacon entre les paumes des mains pendant 60 secondes. Ne pas agitez le flacon
- Déterminer le volume à injecter en vous référant à la prescription et à la fiche de conversion
- Lavez vous soigneusement les mains
- Désinfectez le bouchon de flacon avant le prélèvement avec la compresse imprégnée d'alcool
- Réalisez une antisepsie cutanée de la zone d'injection
- Sortir la seringue à usage unique de son emballage
- Remplissez la seringue (volume d'air = volume de solution à prélever)
- Introduire l'aiguille à 90° au centre du bouchon du flacon
- Retourner le flacon tout en maintenant la seringue et l'aiguille
- Assurez vous que l'aiguille est bien dans le la solution

Comment ?

- Injectez doucement l'air dans le flacon et prélevez le volume nécessaire
- Vérifiez que la seringue ne contient pas de bulle d'air
- Effectuez un pli cutané
- Procédez à l'injection par voie sous cutanée à 90 °dans le pli cutané (dans l'abdomen à au moins 5 cm du nombril ou dans le haut de la cuisse en changeant de zone chaque jour, après formation par un professionnel de santé)



- Jetez la seringue dans le container DASRI
- Remettre le flacon dans son emballage au réfrigérateur ou autre endroit propre (<30°C)

► Que faire en cas d'oubli ?

• **En cas d'oubli** : sauter la dose oubliée et administrer votre prochaine dose à l'heure habituelle.

Ne doublez pas la dose pour compenser une dose oubliée.

Mise en garde et précaution d'emploi

► **Contient de l'alcool benzylique.** Si vous êtes une femme enceinte ou allaitante, informez-en votre médecin.

Quels effets indésirables peuvent survenir avec IMCIVREE® ?

Comme tous les médicaments, IMCIVREE® peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables les plus fréquents	Prévention/surveillance
 Troubles d'hyperpigmentation, naevus mélanocytaire	Faites un examen cutané complet chez un dermatologue tous les ans.
 Nausées, vomissements	Fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers et mangez lentement. Evitez les aliments gras, frits et épicés, et ceux dont l'odeur peut déclencher les nausées. Evitez de rester l'estomac vide, cela accentue les nausées. Buvez plutôt entre les repas. Utilisez les médicaments antiémétiques qui vous ont été prescrits le cas échéant.
 Maux de tête	Pensez à bien vous hydrater. Mangez à heure régulière, ne sautez pas de repas. Evitez tabac et alcool (déclencheurs de maux de tête).
 Erection spontanée, érection augmentée	Si vous avez une érection de plus de 4 heures, veuillez consulter un médecin en urgence.
Réaction au site d'injection	Ces réactions (œdème, rougeur, démangeaison, ...) sont en général légères et de courte durée.



Seuls certains effets indésirables sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien

Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

► Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

Contactez rapidement votre médecin en cas de d'effet indésirable persistant ou s'aggravant



Fiche remise le :

