

# Lidocaïne emplâtre

VERSATIS®



Patient

## A quoi sert ce médicament ?

- Ce médicament a pour principe actif la lidocaïne qui a une action anesthésiante locale lors de sa diffusion. La forme emplâtre exerce une action mécanique en protégeant la zone hypersensible.
- Indication du Cadre de Prescription Compassionnelle : **traitement de la douleur neuropathique périphérique localisée chez les adultes et les enfants âgés d'au moins 7 ans avec un poids corporel > 20 kg**
- Il est prescrit par un médecin hospitalier ou libéral
- Boîte de 30 emplâtres (6 sachets de 5 emplâtres)

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières (dans le cadre de la prescription compassionnelle) sur présentation de votre ordonnance



- Conservation à l'abri de la lumière et à une température ne dépassant pas 25°C
- Une fois ouvert, le sachet se conserve 14 jours, bien remettre les emplâtres restants dans le sachet après ouverture



- Ne jetez pas les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien



- Lavez-vous soigneusement les mains avant et après chaque manipulation du médicament

## Conseils de prise

Quand ?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sur la zone douloureuse, une fois par jour pendant 12 heures maximum sur 24 heures.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Les poils de la zone concernée doivent être coupés avec des ciseaux et non rasés afin d'éviter les irritations</li><li>• En cas de bain ou de douche juste avant l'application, attendre que la peau refroidisse avant de mettre l'emplâtre</li></ul>
Comment ?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ouvrir le sachet en suivant les pointillés</li><li>• Découper l'emplâtre si besoin avec des ciseaux à la taille requise</li><li>• Enlever le film protecteur</li><li>• Appliquer immédiatement sur peau sèche et non irritée ; appuyer pendant quelques secondes</li><li>• N'utiliser que le nombre d'emplâtres nécessaires à l'efficacité du traitement, maximum 3 en même temps chez l'adulte/1 chez l'enfant.</li></ul>



L'efficacité du traitement sera évaluée au bout de 2 à 4 semaines par le médecin

# Interactions avec d'autres médicaments ou votre alimentation



► Communiquez bien l'ensemble de vos traitements à votre médecin et votre pharmacien à chaque nouvelle prescription, informez votre pharmacien si vous prenez un traitement antiarythmique.



► Grossesse et allaitement : administration déconseillée car données insuffisantes

## Quels effets indésirables peuvent survenir avec VERSATIS® ?

<b>Effets indésirables</b>	<b>Conduite à tenir</b>
	<p><b>Réaction locale</b> au site d'application : irritation, démangeaisons, sensation de brûlure, rougeur</p> <p>Des effets indésirables peuvent apparaître lors de la pose de l'emplâtre. La réaction s'estompera en retirant le dispositif de votre peau. Si malgré cela la réaction perdure, contacter votre médecin.</p>
	<p><b>Contact accidentel</b> avec les yeux</p> <p>Un contact accidentel avec les yeux peut provoquer une irritation importante : rincez abondamment. Bien penser à se laver les mains après application de l'emplâtre.</p>

 Seuls certains effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien

## Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

► Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

**Contactez rapidement votre médecin** en cas de :  
- Tout effet indésirable persistant ou s'aggravant



**Contacts utiles :**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Fiche remise le :**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**omedit**  
Normandie