

LIVTENCITY®

► Maribavir



À quoi sert ce médicament ?

- Médicament **antiviral** qui contient une substance activé appelée maribavir.
- Il est destiné à traiter les adultes qui ont subi une **greffe d'organe ou de moelle osseuse** et qui ont développé une **infection à CMV (Cytomégavirus)** qui n'a pas disparu ou qui est retenue après avoir pris un autre médicament antiviral.

Médicament disponible dans les pharmacies de ville sur présentation de votre ordonnance, de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle.

Comprimé dosé à **200 mg** de couleur bleue, ovale, portant l'inscription « SHP » sur une face et « 620 » sur l'autre



► À conserver à une température ne dépassant pas 30°C



► **Ne jetez pas** les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien

Comment prendre ce médicament ?

| | |
|-----------|---|
| Quand ? |h.....et.....h..... |
| Comment ? | Avalez les comprimés, avec de l'eau, chaque jour au même moment de la journée, pendant ou en dehors des repas Le comprimé peut être pris entier, écrasé ou écrasé administré par sonde nasogastrique ou orogastrique |

► Que faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

- **En cas d'oubli :** si la prochaine dose est prévue dans les 3h suivantes, ne prenez pas la dose oubliée. Poursuivez le traitement selon le calendrier habituel. Ne pas doubler la prochaine dose ni prendre plus que la dose prescrite.
- **En cas de vomissement :** ne prenez pas de nouvelle dose. Poursuivez le traitement à l'heure habituelle, **sans la doubler**.

Interactions avec d'autres médicaments ou votre alimentation



Des interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables. Communiquez l'ensemble de vos traitements à votre médecin et votre pharmacien à chaque nouvelle prescription.

- Traitement non recommandé pendant la grossesse
- L'allaitement n'est pas recommandé durant le traitement

Quels effets indésirables peuvent survenir avec LIVTENCITY® ?

Comme tous les médicaments, LIVTENCITY® peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

| Effets indésirables | Prévention |
|---|--|
|  Nausées, vomissements, diarrhée et/ou douleur abdominale | Surveillez votre poids et pensez à bien vous hydrater (1,5 à 2L d'eau/jour). En cas de diarrhée , privilégiez une alimentation pauvre en fibres (féculets, carotte, banane...). Evitez certains aliments qui peuvent stimuler le transit intestinal (laitages, fruits-légumes crus, céréales, aliments gras, épices). En cas de nausées/vomissements , fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers et mangez lentement. Evitez les aliments gras, frits et épiciés, et ceux dont l'odeur peut déclencher les nausées. Evitez de rester l'estomac vide, cela accentue les nausées. Buvez plutôt entre les repas. Utilisez les médicaments antiémétiques qui vous ont été prescrits le cas échéant. |
|   Maux de tête, fatigue | Buvez suffisamment (1,5 à 2L d'eau/jour) et privilégiez une alimentation saine, à heures régulières. Limitez l'usage de psychostimulants (ex : café, tabac et alcool). Respectez des temps de repos dans la journée en conservant une activité même modérée. Couchez-vous à heure régulière ; évitez les couchers tardifs, les grasses matinées. Soyez prudent en cas de conduite automobile. |
|  Troubles du goût | Parlez-en à votre médecin. |



Seuls certains effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien

Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

- ▶ Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

Contactez rapidement votre médecin en cas de d'effet indésirable persistant ou s'aggravant



Fiche remise le :

