



1. Mécanisme d'action et indications

- Inhibiteur compétitif de la protéine kinase UL97.
- **Traitements de l'infection et/ou de la maladie à Cytomégalovirus (CMV) réfractaire** (avec ou sans résistance) à un ou plusieurs traitements antérieurs, y compris le ganciclovir, le valganciclovir, le cidofovir ou le foscarnet chez les patients adultes ayant reçu une greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) ou une greffe d'organe solide (GOS).

2. Conditions de prescription et dispensation

- Liste I
- Médicament à prescription hospitalière
- Médicament disponible en pharmacie de ville

3. Présentations, caractéristiques et conservation

- Comprimé pelliculé dosé à **200 mg**, bleu, ovale et convexe de 15,5 mm, portant l'inscription « SHP » sur une face et « 620 » sur l'autre
- Flacon vrac de 28 comprimés
- A conserver à température ne dépassant pas 30°C



4. Posologie et modalités de prise

➤ Posologie :

- La dose recommandée est de **400 mg** (deux comprimés de 200 mg) **deux fois par jour**, soit une dose quotidienne de **800 mg** pendant **8 semaines**.
- La durée du traitement peut devoir être individualisée en fonction des caractéristiques clinique de chaque patient.
- **Insuffisance rénale** légère, modérée ou sévère : pas d'adaptation posologique
- **Insuffisance hépatique** légère ou modérée : pas d'adaptation posologique/insuffisance hépatique sévère : prudence

➤ Co-administration avec les inducteurs du CYP3A:

- La **co-administration** de LIVTENCITY avec les inducteurs puissants du CYP3A comme la **rifampicine**, la **rifabutine** ou le **millepertuis** **n'est pas recommandée** en raison du risque de diminution de l'efficacité du maribavir.
- Si la **co-administration** de LIVTENCITY avec **d'autres inducteurs puissants ou modérés du CYP3A** (par exemple : carbamazépine, éfavirenz, phénobarbital et phénytoïne) **ne peut être évitée**, la **dose de LIVTENCITY** doit être **augmentée à 1 200 mg deux fois par jour**

➤ Modalités de prise:

- Administration avec ou sans nourriture.
- Le comprimé peut être pris sous la forme d'un comprimé entier, écrasé ou écrasé administré par sonde nasogastrique ou orogastrique.
- **En cas d'oubli:** si la prochaine dose est prévue dans les 3h suivantes, ne pas prendre la dose oubliée. Poursuivre le traitement selon le calendrier habituel. Les patients ne doivent pas doubler leur prochaine dose ni prendre plus que la dose prescrite.
- **En cas de vomissement :** ne pas prendre de nouvelle dose. Poursuivre le traitement à l'heure habituelle, sans la doubler.

5. Précautions d'emploi

- **Grossesse** : LIVTENCITY n'est pas recommandé pendant la grossesse et chez les femmes n'utilisant pas de contraception.
- **Allaitement** : l'allaitement doit être interrompu en cours du traitement avec le LIVTENCITY.

6. Interactions avec d'autres médicaments (liste non exhaustive)

Niveau	Médicaments concernés	Nature de l'interaction médicamenteuse
Contre-indication	Ganciclovir et Valganciclovir	Antagonisme de la phosphorylation et donc de l'effet pharmacologique du ganciclovir par le maribavir.
Association déconseillée	Inducteurs enzymatiques (<i>Apalutamide, carbamazépine, fosphenytoïne, nevirapine, rifampicine...</i>)	Diminution possiblement importante des concentrations de maribavir avec la rifampicine, avec risque de réduction de la réponse virologique. Si l'association ne peut être évitée, augmentation éventuelle de la posologie de maribavir.
Précaution d'emploi	Immunosuppresseurs (<i>Ciclosporine, everolimus, sirolimus, tacrolimus, temsirolimus</i>)	Possible augmentation des concentrations de l'immunosuppresseur.

7. Principaux effets indésirables

- Altération du goût
- Diarrhée, nausées, vomissements
- Fatigue
- Céphalée
- Douleur abdominale haute
- Diminution de l'appétit

D'autres EI peuvent survenir (liste non exhaustive, voir RCP).

Pensez à déclarer tout effet indésirable à votre [CRPV](#) et/ou à les contacter en cas de question.

