

OPZELURA® 15mg/g

► Ruxolitinib



À quoi sert ce médicament ?

- C'est un traitement du vitiligo non-segmentaire avec atteinte faciale chez l'adulte et l'adolescent de plus de 12 ans
- Il est prescrit par un médecin dermatologue.

Médicament disponible dans les pharmacies de ville sur présentation de votre ordonnance, de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle.



Crème pour application cutanée de couleur blanche à blanc cassé en tube de 100g.



► À conserver à température ambiante 6 mois maximum après ouverture (noter la date d'ouverture sur le tube afin de ne pas l'oublier).



► Ne jetez pas les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien

Comment prendre ce médicament ?



À remplir avec l'aide d'un professionnel de santé.

A remplir avec l'aide d'un professionnel de santé.	Dose	Maximum 10% de la surface corporelle (= 10 fois la taille d'une main)
Renseigné avec selon l'ordonnance du/...../.....	Comment ?	Appliquer une fine couche de crème 2 fois par jour dans les zones dépigmentées de la peau.

N'arrêtez jamais ou ne modifiez jamais votre traitement sans l'avis de votre médecin.

Cette fiche n'est pas une ordonnance, respectez les consignes d'utilisation de votre médecin.

Quelques conseils



► Lavez-vous les mains avant et après application de la crème sauf si elles font l'objet du traitement.



► Ne pas laver la peau traitée pendant au moins 2 heures après l'application de la crème.



► N'appliquez pas la crème sur **les lèvres** pour éviter tout risque d'ingestion.



► Si vous avez pris plus d'OPZELURA® que vous n'auriez dû, vous risquez d'avoir des effets indésirables. **Informez immédiatement votre médecin.**



► L'OPZELURA® n'est pas destinée à une administration par voie ophtalmique, orale ou intra-vaginale. En cas d'exposition accidentelle sur les yeux ou les muqueuses, **essuyez la crème et rincez avec de l'eau.**

Interactions avec d'autres médicaments ou votre alimentation



Il n'est pas recommandé d'utiliser de façon concomitante d'autres traitements par voie cutanée sur les mêmes zones d'application de l'OPZELURA®.

N'appliquez rien dans les 2h après l'application d'OPZELURA®. (S'applique également aux émollients et crèmes solaires).



► L'OPZELURA® est contre-indiqué avec la grossesse et l'allaitement.

► En cas de désir de grossesse, parlez-en avec votre médecin.

► Le traitement doit être interrompu 4 semaines avant le début de l'allaitement.

Quel effet indésirable peut survenir avec OPZELURA® ?

Comme tous les médicaments, OPZELURA® peut entraîner des effets indésirables, mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

- Acné au site d'application



Seuls certains effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien

Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

- Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

Contactez rapidement votre médecin en cas de d'effet indésirable persistant ou s'aggravant



Fiche remise le :

