



Nérandomilast

18 mg comprimé
9 mg comprimé

A quoi sert ce médicament ?

- **Indications :** Traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique ou de la fibrose pulmonaire progressive chez les adultes dont la maladie s'aggrave malgré un traitement par anti-fibrosant, ou qui ne peuvent bénéficier d'un traitement par anti-fibrosant en raison d'une contre-indication ou d'une intolérance.
- **Présentation :**
 - Nérandomilast 9 mg, comprimé pelliculé, conditionnement de 56 comprimés
 - Nérandomilast 18 mg, comprimé pelliculé, conditionnement de 56 comprimés
- **Sous autorisation d'accès compassionnel**

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières sur présentation de votre ordonnance



- Conservez à température ne dépassant pas 30°C, hors de la portée des enfants.
- Ne jetez pas les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien.

Conseils de prise :

Quand ?	h..... eth..... = 2 prises par jour, à heure fixe, idéalement à 12h d'intervalle, pendant ou en dehors des repas
Comment ?	• Les comprimés doivent être avalés en entiers avec de l'eau • Si trouble de la déglutition : ▪ Possibilité de disperser un comprimé dans un verre d'environ 100 mL d'eau non gazeuse. ▪ Le comprimé doit être mis dans l'eau sans être écrasé et la solution doit être mélangée régulièrement pendant 15 à 20 minutes jusqu'à dispersion en toutes petites particules (les comprimés ne se dissolvent pas entièrement). ▪ La dispersion obtenue doit être bue dans les 2 heures suivant le mélange. Si la dispersion n'est pas bue immédiatement, le patient doit la mélanger à nouveau avant de la boire. ▪ Ensuite, le verre doit être rincé avec 100 mL d'eau qui devront également être avalés pour assurer l'administration de la dose complète.



- En cas d'oubli d'une dose, la dose suivante doit être prise à l'heure habituelle, ne pas doubler la dose
- En cas de vomissement : ne pas prendre de nouvelle dose, prendre la prise suivante à l'heure habituelle sans doubler la dose

Interactions avec d'autres médicaments ou votre alimentation



Des interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables, Communiquez bien l'ensemble de vos traitements à votre médecin et votre pharmacien à chaque nouvelle prescription

- ▶ Eviter le jus de pamplemousse

- ▶ Si vous êtes intolérant au galactose ou avez un syndrome de malabsorption du glucose, un déficit en lactose, ce traitement ne vous est peut-être pas adapté



- ▶ Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement.
- ▶ Interrompez l'allaitement durant le traitement

Quels effets indésirables peuvent survenir avec Nerandomilast ?

Effets indésirables les plus fréquents		Prévention
	Diarrhées Nausées Diminution de l'appétit Poids diminué	En cas de nausées, fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers et mangez lentement. Evitez les aliments gras, frits et épicés, et ceux dont l'odeur peut déclencher les nausées. Evitez de rester l'estomac vide, cela accentue les nausées. En cas de diarrhée, utilisez les médicaments antidiarrhéiques qui vous ont été prescrits et pensez à bien vous hydrater.
	Douleurs dans le dos	Evitez les mouvements répétitifs et les efforts physiques importants. Signalez-les à votre médecin, infirmier(ère) ou pharmacien. Des médicaments contre la douleur pourront vous être prescrits.



Seuls certains effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

- ▶ Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

Contactez rapidement votre médecin en cas de :

- Tout effet indésirable persistant ou s'aggravant



Contacts utiles :

Fiche remise le :

