



SKYCLARYS®

► Omaveloxolone

À quoi sert ce médicament ?

- SKYCLARYS® est indiqué dans le traitement de l'ataxie de Friedreich chez les adultes et les adolescents âgés de 16 ans et plus.

Médicament disponible dans les pharmacies hospitalières sur présentation de votre ordonnance, de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle.

Gélules de **50 mg** (flacon de 90 gélules)



- Aucune précaution particulière de conservation concernant la température.



- **Ne jetez pas** les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien.

Comment prendre ce médicament ?

Quand ?	1 prise par jour : A prendre à jeun au moins une heure avant le repas ou deux heures après, à heures fixes de préférence.
Comment ?	3 gélules de 50 mg en 1 prise à avaler avec un grand verre d'eau. En cas de difficultés de déglutition : ouvrir les gélules et mélanger la poudre dans deux cuillères à soupe de compote de pommes. Ne pas conserver le mélange pour une prise ultérieure.
Adaptation posologique ?	Certaines situations cliniques peuvent nécessiter des adaptations posologiques : respectez les recommandations de votre médecin.

- Que faire en cas d'oubli ?

- **En cas d'oubli** : sauter la dose oubliée et administrer votre prochaine dose à l'heure habituelle.
Ne doublez pas la dose pour compenser une dose oubliée.

- Que faire en cas de vomissements ?

- **Après la prise du médicament** : ne pas reprendre la dose.
Ne doublez pas la dose pour compenser.

Mise en garde et précaution d'emploi



Des interactions avec d'autres médicaments peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables.

Communiquez bien l'ensemble de vos traitements à votre médecin et votre pharmacien à chaque nouvelle prescription.



- **Contre-indication du traitement en cas de grossesse ou d'allaitement.**

L'usage d'un moyen de contraception autre qu'hormonal est recommandé.

Quels effets indésirables peuvent survenir avec SKYCLARYS® ?

Comme tous les médicaments, SKYCLARYS® peut entrainer des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables les plus fréquents		Prévention/surveillance
	Elévation légère à modérée des enzymes hépatiques voire hépatite	Pensez à pratiquer les examens biologiques prescrits par votre médecin.
	Nausées, vomissements	Fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers et mangez lentement. Evitez les aliments gras, frits et épicés, et ceux dont l'odeur peut déclencher les nausées. Evitez de rester l'estomac vide, cela accentue les nausées. Buvez plutôt entre les repas. Utilisez les médicaments antiémétiques qui vous ont été prescrits le cas échéant.
	Maux de tête	Pensez à bien vous hydrater. Mangez à heure régulière, ne sautez pas de repas. Evitez tabac et alcool (déclencheurs de maux de tête).
	Fatigue, dorsales, musculaires douleurs spasmes	Contactez votre médecin si vous ressentez un ou plusieurs de ces effets indésirables.
	Grippe	Contactez votre médecin si vous ressentez un ou plusieurs de ces effets indésirables.



Seuls certains effets indésirables sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien

Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

► Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

Contactez rapidement votre médecin en cas de d'effet indésirable persistant ou s'aggravant 

Fiche remise le :

