




Itraconazole 10 mg/mL

Solution buvable 150 mL

A quoi sert ce médicament ?

Indication : Traitement de la teigne à Microsporum chez les patients pour lesquels les gélules d'Itraconazole ne sont pas adaptées.

Médicament disponible sous AAC (Autorisation d'Accès Compassionnel) uniquement dans les pharmacies hospitalières sur présentation de votre ordonnance hospitalière.



► Conservation à température ambiante, ne pas dépasser 25°. Se conserve 30 jours après ouverture



► Ne jetez pas les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien



► Lavez-vous soigneusement les mains avant et après chaque manipulation du médicament



► Protégez-vous du soleil (médicament photosensibilisant)

Conseils de prise

Quand ?	1 prise par jour en dehors des repas pendant 6 semaines
Comment ?	 mg soit mL Gobelet doseur gradué fourni avec le produit



► Que faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

Prenez la dose oubliée dès que possible et poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu. Cependant, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, prenez seulement cette dose selon l'horaire prévu. Ne doublez pas la dose.

Interactions avec d'autres médicaments ou votre alimentation



Des interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables, Communiquez bien l'ensemble de vos traitements à votre médecin et votre pharmacien à chaque nouvelle prescription.



► Vous et votre partenaire devez utiliser des méthodes de contraception efficaces (préservatifs et une autre méthode) pendant toute la durée du traitement et jusqu'à l'apparition des règles suivantes

► Interrompez l'allaitement durant le traitement

Quels effets indésirables peuvent survenir avec l’itraconazole ?

Effets indésirables	Prévention
 Vertiges, céphalées, fièvre	Evitez de vous lever trop brusquement. Vous pouvez prendre du paracétamol si besoin.
 Troubles du bilan hépatique	Surveiller régulièrement la fonction hépatique.
 Dyspepsie (douleur ou inconfort au niveau de l’estomac), douleurs abdominales, nausées/ vomissements, dysgueusie	Fractionnez vos repas, prenez des repas légers et mangez lentement.
 Diarrhées	Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool. Buvez au moins 2L/j et privilégiez les féculents, les carottes, bananes. En cas de persistance, prévenez votre médecin.
 Eruption cutanée	Utilisez un savon doux et un agent hydratant. Evitez les expositions au soleil. Protection solaire : écran total. Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager.
 Dyspnée, toux	

 Seuls certains effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien

 Pensez à faire pratiquer les examens biologiques (**bilan hépatique**) prescrits par votre médecin

Que faire en cas de survenue d’effets indésirables?

► Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

Contactez rapidement votre médecin en cas de :

- Tout effet indésirable persistant ou s’aggravant



Contacts utiles :

Fiche remise le :

