



HUMATIN®

► Paromomycine

À quoi sert ce médicament ?

- Paromomycine HUMATIN® est utilisé dans des infections dues à des parasites :
 - Cryptosporidiose
 - Giardiase
 - Amibiase
 - Infection à Dientamoeba fragilis
 - Infection à Blastocystis hominis
- Médicament disponible uniquement en pharmacie hospitalière sur présentation de votre ordonnance et de votre carte vitale.

Gélule dosée à **250 mg**



► Conservation à température ambiante, hors de la vue et de la portée des enfants



► **Lavez-vous** soigneusement les mains avant et après chaque manipulation des gélules



► **Ne jetez pas** les boîtes entamées, merci de les rapporter à votre pharmacien

Comment prendre ce médicament ?

Quand ?	= prise(s) par jour à heure fixe pendant les repas
Comment ?	Administration par voie orale avec un peu de liquide



- En fonction de l'indication, la dose, les moments de prise et la durée de traitement peuvent changer
- Respectez la posologie prescrite par votre médecin
- N'arrêtez jamais ou ne modifiez jamais le rythme de prise de votre traitement sans l'avis de votre médecin.

Interactions avec d'autres médicaments ou votre alimentation

Des interactions avec d'autres médicaments peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables.

Ne prenez pas de nouveau médicament, même disponible sans ordonnance ou à base de plantes sans l'accord du médecin ou le conseil d'un pharmacien.

Vérifier avec votre médecin et votre pharmacien que les médicaments (prescrits ou non) et/ou autres substances (aliments, plantes, probiotiques, huiles essentielles, compléments alimentaires...) que vous utilisez sont compatibles avec votre traitement.



- **Grossesse** : traitement contre-indiqué
- **Allaitement** : interrompre l'allaitement durant le traitement

Quels effets indésirables peuvent survenir avec HUMATIN® ?

Comme tous les médicaments, paromomycine peut entraîner des effets indésirables mais il est possible que vous n'en éprouviez aucun.

Effets indésirables	Prévention
  Diarrhée, perte d'appétit, nausées/vomissements, douleurs abdominales	Surveillez votre poids et pensez à bien vous hydrater (1,5 à 2L d'eau/jour. En cas de diarrhée , privilégiez une alimentation pauvre en fibres (féculents, carotte, banane...). Evitez certains aliments qui peuvent stimuler le transit intestinal (laitages, fruits-légumes crus, céréales, aliments gras, épices). En cas de nausées/vomissements , fractionnez votre alimentation en plusieurs repas légers et mangez lentement. Evitez les aliments gras, frits et épicés, et ceux dont l'odeur peut déclencher les nausées. Evitez de rester l'estomac vide, cela accentue les nausées. Buvez plutôt entre les repas. Utilisez les médicaments antiémétiques qui vous ont été prescrits le cas échéant.
 Maux de tête	Pensez à bien vous hydrater. Mangez à heure régulière, ne sautez pas de repas. Evitez tabac et alcool (déclencheurs de maux de tête). Evitez les couchers tardifs, les grasses matinées ; dormez suffisamment la nuit.
 Etourdissements	Evitez la consommation d'excitants (café, alcool, tabac). En cas de vertiges, reposez-vous au calme et décomposez vos mouvements. Soyez prudent en cas de conduite automobile. Consultez votre médecin en cas de vertiges persistants, de maux de tête inhabituels, de bourdonnements d'oreille ou de vomissements.

 Seuls certains effets indésirables sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien

 Dans tous les cas, pensez à faire pratiquer les examens biologiques prescrits par votre médecin.

Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

► Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

Contactez rapidement votre médecin en cas de :

- Diarrhées sévères ou persistantes
- Réactions allergiques
- Perte d'audition, acouphènes



Fiche remise le :

