

LAMPRENE (CLOFAZIMINE)

capsule molle 50 mg et 100 mg



FICHE
CONSEIL

Patient

A quoi sert ce médicament ?

- Ce médicament est un antibiotique actif sur les mycobactéries.
- **Il est prescrit pas un médecin hospitalier**
- Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières sur présentation de votre ordonnance



Conservation : à conserver à une température ne dépassant pas 25°C, conserver le flacon soigneusement fermé et à l'abri de l'humidité.



Ne jetez pas les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien

Conseils de prise

Quand ?	 mg par jour soit capsule(s), à heure fixe, au cours d'un repas ou avec un verre de lait pour assurer une absorption maximum.
Comment ?	Avalez la capsule avec de l'eau, chaque jour au même moment de la journée. Ne pas mâcher, ni couper, ni écraser, ni dissoudre, ni ouvrir la capsule .

► Que faire en cas d'oubli ou de vomissement ?

- **En cas d'oubli** : Ne doublez pas la dose pour compenser une dose oubliée
- **En cas de vomissement** : ne prenez pas de nouvelle dose. Poursuivez le traitement à l'heure habituelle, **sans la doubler**.

Interactions avec d'autres médicaments ou votre alimentation



Ce médicament est contre indiqué si vous êtes allergiques à l'arachide (cacahuète), au soja ou aux autres excipients.

Des interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables, Communiquez bien l'ensemble de vos traitements à votre médecin et votre pharmacien à chaque nouvelle prescription,

En cas de grossesse mesurer la balance bénéfice risque du traitement,

Une décision doit être prise quant à l'arrêt de l'allaitement en tenant compte des bienfaits de l'allaitement sur la santé et le développement et des effets indésirables potentiels de la clofazimine chez le nourrisson allaité.



Quels effets indésirables peuvent survenir avec la clofazimine ?

Effets indésirables	Prévention
 Troubles gastro intestinaux (douleurs abdominales, nausées, vomissements et diarrhées)	Ces troubles peuvent être provoqués par l'accumulation de clofazimine dans la muqueuse intestinale notamment en cas de traitement prolongé, Si ces troubles surviennent, parlez en à votre médecin qui si besoin adaptera la posologie ou espacera les prises. En cas de diarrhée, privilégiez une alimentation pauvre en fibres (féculents, carotte, banane, ...). Evitez certains aliments qui peuvent stimuler le transit intestinal (laitage, légumes crus, céréales, aliments gras, épices). Pensez à bien vous hydrater. En cas de vomissements, fractionnez votre alimentation, buvez en petite quantité.
 Photosensibilisation	Evitez l'exposition solaire et protégez vous (vêtements couvrants, écran total).
 Coloration anormale rougeâtre à brun foncé de la conjonctive, du liquide lacrymal, de la sueur, des expectorations, des urines, des fèces, du sperme, du lait maternel, des cheveux	Ce phénomène est réversible (parfois en plusieurs mois après l'arrêt du traitement),
 Troubles du rythme cardiaque	Votre médecin pourra être amené à réaliser un électrocardiogramme si nécessaire en fonction des autres traitements que vous prenez ou de la posologie de Lamprene prescrite.
 Troubles de la vision	Soyez vigilant notamment en cas de conduite de véhicule ou d'utilisation de machines
	Seuls certains effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien
	Pensez à faire pratiquer les examens biologiques prescrits par votre médecin

Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

► Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

Contactez rapidement votre médecin en cas de :
- Tout effet indésirable persistant ou s'aggravant

Contacts utiles :

Fiche remise le :

