

Acide chénodésoxycholique 250 mg gélule



FICHE
CONSEIL
Patient
Adulte

A quoi sert ce médicament ?

Indication: L'acide chenodesoxycholique est un médicament orphelin indiqué dans le traitement des anomalies congénitales de la synthèse des acides biliaires primaires se manifestant par une xanthomatose cérébrotendineuse.

Conditions de prescription: Médicament soumis à prescription hospitalière. Prescription réservée aux spécialistes en endocrinologie, diabète et maladies métaboliques, en gastro-entérologie et hépatologie, en neurologie ou en pédiatrie.

Présentation: Gélules contenant 250 mg d'acide chenodesoxycholique

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières sur présentation de votre ordonnance



► Ne jetez pas les conditionnements entamés, merci de les rapporter à votre pharmacien



► Conservation: à température ambiante



► Lavez-vous soigneusement les mains avant et après chaque manipulation du médicament

Conseils de prise

Quand ?	À heure fixe pendant ou en dehors des repas gélule.....fois par jour
Comment ?	Les gélules doivent être avalées entières avec suffisamment d'eau, Si difficulté à les avaler: possibilité d'ouvrir les gélules et de les mélanger à 25ml de bicarbonate de sodium 8,4%



► Que faire en cas d'oubli ou de vomissement ? Ne pas reprendre la dose, attendre la prochaine prise,

Interactions avec d'autres médicaments ou votre alimentation

Des interactions avec d'autres médicaments et/ou votre alimentation peuvent avoir une influence sur l'efficacité de votre traitement ou la survenue d'effets indésirables. Communiquez bien l'ensemble de vos traitements à votre médecin et votre pharmacien à chaque nouvelle prescription,

Si l'administration de ciclosporine, tacrolimus, phénobarbital, contraceptif oral est jugée nécessaire: surveillance biologique à renforcer (risque de diminution d'efficacité de l'acide chénodésoxycholique)

Les topiques gastro intestinaux à base d'hydroxyde d'aluminium, la diosmectite doivent être pris 2 heures avant ou après la prise d'acide chénodésoxycholique

En cas de traitement par cholestyramine, prendre l'acide chénodésoxycholique 1 heure avant ou 4 à 6 heures après.

► Femme en âge de procréer: utiliser une méthode de contraception efficace pendant toute la durée du traitement

► Allaitement, pas de données, un risque pour les nouveau-nés/nourrissons ne peut être exclu.

Une décision doit être prise en prenant en compte le bénéfice de l'allaitement pour l'enfant au regard du bénéfice du traitement pour la femme



Quels effets indésirables peuvent survenir avec l'acide chénodésoxycholique ?

Effets indésirables	Prévention
 Constipation	Buvez au moins 2L d'eau par jour. Privilégiez une alimentation riche en fibres (son, céréales, pain complet, légumes verts, fruits et fruits secs). Pratiquez si possible une activité physique régulière. Surveillez la reprise du transit. En cas de constipation avec de fortes douleurs abdominales et de la fièvre, consultez votre médecin.
 Perturbation du bilan hépatique	Bien réaliser le bilan biologique prescrit par votre médecin

 Seuls certains effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien

 Pensez à faire pratiquer les examens biologiques **prescrits** (**bilan hépatique**, cholestanol sérique et/ou les alcools biliaires urinaires doivent être surveillés tous les 3 mois jusqu'à atteinte du contrôle métabolique, puis une fois par an)

Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

► Vous pouvez poser une question auprès de votre [centre régional de pharmacovigilance](#) ou déclarer tout effet indésirable sur le site : [signalement-sante-gouv-fr](#)

Contactez rapidement votre médecin en cas de :
- Tout effet indésirable persistant ou s'aggravant



Contacts utiles :

Fiche remise le :

