

RADIOPHARMACIE



V1
06 2026

Livret patient

^{177}Lu -PSMA


VOTRE THÉRAPIE N'A PLUS DE SECRETS !





Sommaire

Informations générales	1
Mécanisme d'action	2
Mode d'emploi et plan personnalisé de soin	3
Effets indésirables et conseils associés	4
Radioprotection	8
Autres traitements, que faire ?	9
Soins d'urgence	11
Messages à retenir...	12



Informations générales

La thérapie en médecine nucléaire consiste à utiliser la radioactivité pour la prise en charge de certains types de cancers.


Le ^{177}Lu -PSMA fait partie des thérapies proposées dans votre hôpital. C'est un médicament radiopharmaceutique pour les adultes atteints d'un cancer de la prostate progressif résistant à la castration, qui s'est propagé à d'autres parties du corps (métastatique) et qui a déjà été traité avec d'autres médicaments contre le cancer.

Ce livret vous fournira l'ensemble des informations nécessaires sur le ^{177}Lu -PSMA. Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires sur votre maladie, vos traitements, les médecins, les radiopharmaciens ainsi que le personnel soignant de l'établissement répondront à vos questions.

Il a été élaboré par un comité de radiopharmaciens de la SOciété Française de RAdiopharmacie (SOFRA) piloté par M. Gallet avec la contribution de W. Ben Saci, C. Bolot, S. Chaib, J. Costes, F. Debordeaux, B. Dekyndt, P. Garrigue, Y. Le duigou, P. Reynaud-Orhon.



Mécanisme d'action



Destruction de la cellule tumorale




Irradiation locale du cancer de la prostate



Mode d'emploi et plan personnalisé de soin

03

● Mode d'emploi



Perfusion intra veineuse de 30 minutes
+ surveillance de 6 heures



Toutes les 6 semaines pour 6 cures au
total



Bilans biologiques et imageries de
contrôles réguliers



Antinauséeux avant et/ou après la
perfusion possible

[illegible][illegible]



Effets indésirables et conseils

04



Le traitement peut entraîner des effets indésirables, parmi les plus fréquents :

- Toxicités hématologiques (baisse des plaquettes, globules rouges et globules blancs)



- Limiter les contacts rapprochés avec les personnes ayant une **infection contagieuse**. Appliquer les **gestes barrières**.
- Consulter le médecin traitant en cas de **fièvre supérieure à 38°C**. Attention au paracétamol qui peut masquer les symptômes.
- Se **laver les mains** et désinfecter toute plaie soigneusement.
- Bien respecter le rythme des **bilans sanguins**.


Effets indésirables et conseils

05



Le traitement peut entraîner des effets indésirables, parmi les plus fréquents :

- Douleurs osseuses potentiellement majorées dans les jours qui suivent le traitement



- Pour limiter les douleurs en particulier au niveau osseux, prendre les médicaments antidouleurs prescrits en respectant les doses.

- Prévenir votre médecin si celles-ci persistent.

- Sécheresse buccale et oculaire progressives



- Une baisse de la salivation est fréquemment observée et pourra s'intensifier au fur et à mesure des cures

- En cas d'apparition de difficultés de salivation, utiliser un substitut salivaire

- Au niveau oculaire, l'usage d'un collyre à base de larmes artificielles est possible




Effets indésirables et conseils

06



Le traitement peut entraîner des effets indésirables, parmi les plus fréquents :

- Troubles de la fonction rénale, risque d'insuffisance rénale




- Boire au moins 1,5 L d'eau par jour durant les 2 jours qui suivent la séance

- Fatigue, en particulier la semaine qui suit le traitement



- Respecter des temps de repos dans la journée, tout en conservant une activité même modérée



- Rester à l'écoute de votre corps. En cas de fatigue inhabituelle, consulter votre médecin

Effets indésirables et conseils

07



Le traitement peut entraîner des effets indésirables, parmi les plus fréquents :

- **Nausées, vomissements, perte d'appétit, troubles du transit**




- Veiller à avoir une **bonne hygiène de vie** (manger et boire sainement)
- Prescription d'**anti-nauséeux** possible en cas de symptômes persistants

Si vous ressentez des effets non mentionnés, parlez-en à votre oncologue, votre médecin nucléaire, votre médecin généraliste ou votre pharmacien.


● Pour limiter l'exposition de votre entourage :

Limitier les contacts
de moins de 1 m




Pendant ... jours

Limitier les contacts
avec les femmes enceintes et les
jeunes enfants



Pendant ... jours

Utiliser des préservatifs lors
des relations sexuelles



Pendant ... jours

Dormir dans des lits séparés




Pendant ... jours

● Pour limiter le risque de contamination à votre domicile :


Collecter les
déchets contaminés
pendant ... jours
(urine, sang, selles...)



Jeter les déchets après
... mois



Utiliser les toilettes en position assise.
Tirer la chasse d'eau **deux fois**



Lavez-vous les mains **deux fois**
après être allé aux toilettes.

Autres traitements ?



9

Préciser à votre médecin ce que vous prenez ou souhaitez prendre.

Ne prenez pas de médicaments autres que ceux prescrits, sans avis de votre médecin ou de votre pharmacien.



Médicaments habituels



Des plantes et des tisanes



Des médicaments hors ordonnance (sirop, crème...)




10 Quelques informations utiles...



En cas de voyage, vous pouvez faire sonner le portique de sécurité. Prévenez votre médecin afin qu'il vous rédige un certificat médical.

Les vaccinations sont possibles. Parlez-en à votre médecin.




Soins d'urgence

11



Au moment du traitement, une **lettre d'information** ou une **carte** vous sera remise, à garder toujours sur vous durant au moins **3 mois**



Présentez cette **lettre/carte** en cas d'**hospitalisation en urgence** ou d'**assistance médicale**

L'**équipe médicale spécialisée** devra être **contactée** pour assurer le suivi de votre traitement



Messages à retenir

Prévenir le service spécialisé en cas de :

- fièvre, frisson ou symptômes infectieux sévères
- situation retardant ou empêchant votre traitement



Le suivi des règles de radioprotection est indispensable au bon déroulement de votre traitement

Une bonne hygiène de vie permet de limiter les effets indésirables.

Une hydratation (>1.5 L par jour) est primordiale suite au traitement.

Les mystères de votre thérapie percés !

Des associations de patients, d'anciens patients ou de proches de patients sont représentées dans votre région et pour certaines au sein même de l'établissement. Leur aide peut vous être précieuse. N'hésitez pas à les contacter. Une liste de ces associations figure dans votre livret d'accueil.



Contacts utiles



etiquette service