TACROLIMUS 0,1% pommade

PROTOPIC 0,1%® / TAKROZEM Gé 0,1%®



FICHE CONSEIL

Patient

A quoi sert ce médicament ?

Indication(s) : traitement du vitiligo chez l'adulte et l'enfant à partir de 2 ans. Le tacrolimus diminue la réaction immunitaire locale responsable de la disparition des cellules qui pigmentent la peau et **peut favoriser la repigmentation. Les premiers signes de repigmentation peuvent apparaître après 6 à 12 semaines de traitement.**

Conditions de prescription : prescription par un dermatologue dans le cadre du dispositif de prescription compassionnelle (CPC).

Présentation : pommade **disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières** sur présentation de votre ordonnance



► **Conservation** : conserver à température ambiante, à une température ne dépassant pas 25 °C. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.



► Ne jetez pas les tubes entamés ou inutilisés avec les ordures ménagères : rapportez-les à votre pharmacien.



► **Lavez-vous les mains après l'application, sauf si vos mains sont elles-mêmes traitées. Évitez tout contact avec les yeux et les muqueuses.**

Conseils de prise

Quand ?	Traitement d'attaque : matin et soir, selon la prescription du dermatologue (durée maximale : 6 mois).
Comment ?	**Appliquer une fine couche uniquement sur les zones atteintes.** Ne pas couvrir par un pansement occlusif. Respecter **2 h avec l'application d'un émollient**. Éviter bain, douche ou baignade immédiatement après l'application.



En cas d'oubli : appliquez la pommade dès que vous vous en rendez compte, sauf si l'application suivante est proche. Ne doublez pas la quantité appliquée.

Interactions avec d'autres médicaments ou votre alimentation



Informez votre médecin et votre pharmacien de tous vos traitements, y compris ceux obtenus sans ordonnance. Après application cutanée, le passage du tacrolimus dans le sang est faible : les interactions médicamenteuses sont peu probables.



► **Alcool** : la consommation d'alcool peut provoquer rougeur du visage, sensation de chaleur ou irritation de la peau. Limitez ou évitez l'alcool si ces symptômes apparaissent.



► **Grossesse / allaitement** : prévenez votre médecin en cas de grossesse, de projet de grossesse ou d'allaitement. N'utilisez pas ce médicament sans avis médical.

► **Soleil / UV** : dans le vitiligo, une exposition modérée peut être recommandée par votre dermatologue. Elle doit être réalisée à distance de l'application. Évitez les expositions excessives et protégez les zones non concernées selon les conseils de votre dermatologue.

Quels effets indésirables peuvent survenir avec PROTOPIC® Tacrolimus 0,1% pom?

Effets indésirables	*Prévention*
Rougeur, irritation ou démangeaisons au site d'application	**Fréquentes au début du traitement et généralement transitoires**. Appliquez une fine couche. Consultez si elles persistent ou s'aggravent.
Sensation de chaleur, brûlure, douleur ou picotements	Ces sensations sont souvent transitoires. Consultez si elles sont importantes ou persistantes.
Rougeur du visage ou irritation après consommation d'alcool	Limitez ou évitez l'alcool si cette réaction apparaît.
Folliculite, boutons ou infection cutanée	N'appliquez pas la pommade sur une zone infectée sans avis médical. Contactez votre médecin en cas de signes d'infection.
Infection à herpès (boutons groupés, vésicules douloureuses)	Arrêtez l'application sur la zone concernée et contactez rapidement votre médecin.

Seuls certains effets indésirables les plus fréquents sont listés ci-dessus. Pour en savoir plus, reportez-vous à la notice de votre médicament ou demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien

Un suivi dermatologique régulier est nécessaire afin d'évaluer la re-pigmentation, la tolérance du traitement et l'état des zones traitées.

Que faire en cas de survenue d'effets indésirables?

► Vous pouvez poser une question auprès de votre centre régional de pharmacovigilance ou déclarer tout effet indésirable sur le site : signalement-sante-gouv-fr

Contactez rapidement votre médecin en cas de :
• réaction cutanée importante, persistante ou qui s'aggrave ;
• signes d'infection de la peau (vésicules, croûtes, douleur, suintement, fièvre) ;
• apparition d'une lésion cutanée inhabituelle ou d'un ganglion persistant.

Contacts utiles :

_____

_____

Fiche remise le :

_____

_____



omedit Normandie

Version de Mois, Année