

KARDEGIC®

Acide acétylsalicylique

Présentation et caractéristiques

Kardegic® est un antiagrégant plaquettaire. Il a pour rôle d'empêcher la formation de caillots, de thrombose dans les vaisseaux (= vaisseaux bouchés).

Présentation : Kardegic ® 75 mg ou 160 mg ou 300 mg (boîtes de 30 sachets).
A conserver à température ambiante.

Posologie et mode d'administration

La posologie usuelle est de **1 sachet par jour**, en une prise quotidienne, au même moment de la journée, **au cours d'un repas**.

Verser le contenu du sachet dans un grand verre d'eau. Une dissolution totale est obtenue rapidement.

- **En cas d'oubli** d'une dose, continuer le traitement mais prévenir le prescripteur.

Principaux effets indésirables

Le principal effet est lié à son mécanisme d'action : une fluidification trop importante du sang conduit **au risque hémorragique = risque de saignement**.

Ce risque peut arriver en cas de **traumatisme, d'acte chirurgical** (par exemple soin dentaire), ou avec la **prise d'un nouveau médicament**.

- ✓ **Ne prendre aucun nouveau médicament sans l'accord du médecin.**
- ✓ **Consultez votre médecin en cas de saignement anormal (par sa localisation ou sa durée).**

Effets indésirables	Prévention	Conduite à tenir
Intolérance gastrique	Prendre le médicament au cours d'un repas. Eviter alcool, café, boissons et aliments acides, les épices.	Prévenez votre médecin, qui pourra éventuellement vous prescrire un traitement symptomatique.
Risque de saignement, voire hémorragie	Utiliser une brosse à dent souple. Ne pas prendre d'Aspirine supplémentaire, ni d'anti-inflammatoires en automédication. Si vous avez déjà eu un ulcère digestif, prévenez votre médecin.	En cas de saignement, prévenir votre médecin.
Réaction d'hypersensibilité	En cas d'antécédent d'allergie à l'Aspirine®, prévenez votre	Si apparition d'urticaire ou d'asthme au cours du

	médecin.	traitement par Kardegic®, prévenez immédiatement votre médecin.
--	----------	---

La liste complète des effets indésirables est consultable sur la notice du médicament.

NB : de nombreuses spécialités médicamenteuses contiennent de l'Acide acétylsalicylique (Aspégic®, Aspro®, Aspirine du Rhône®...). Prendre ne serait ce qu'une seule dose de ces médicaments, en plus de votre Kardégic®, augmenterait la quantité de ce composé dans votre sang et donc le risque de saignement.

Médicaments pouvant provoquer des effets indésirables ou diminuer l'efficacité du KARDEGIC®

Médicaments	Risque	Conduite à tenir
Anti-inflammatoire (Advil®, Spedifen®, Ibuprofène®, Aspirine...) Anticoagulants oraux (Coumadine®, Previscan®, Sintrom®, Xarelto®, Pradaxa®, Eliquis®)	Augmentation du risque hémorragique.	Demandez conseil à votre pharmacien.
Topiques gastro-intestinaux (Maalox®, Topaal®, Pepciduo®...)	Diminution de l'effet du Kardegic®.	Les prendre à distance de toute prise de médicaments : au moins 2 heures.

Kardégic®, grossesse et allaitement

Informez votre médecin si vous découvrez que vous êtes enceinte ou si vous souhaitez l'être.

Conseils à suivre



Le sachet, après dissolution dans de l'eau, doit être bu en **une prise quotidienne, à heure fixe, pendant le repas.**



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



Prenez l'avis de votre médecin avant toute prise d'un nouveau médicament (même les médicaments ne nécessitant pas d'ordonnance).



Toute décision de modification de dose ou arrêt du médicament doit être prise par le médecin. Ne prenez jamais l'initiative seul.



Avant tout acte chirurgical ou prise d'un nouveau médicament, signalez à tout professionnel de santé (médecin, chirurgien, dentiste, pharmacien, infirmier, sage-femme) que vous prenez un traitement antiagrégant plaquettaire.



Ne pas laisser à la portée des enfants.



Contactez rapidement votre médecin en cas :

- d'apparition de selles noires, de saignements de nez, des gencives, d'hématomes importants.
- d'apparition d'asthme ou d'urticaire.