




# **Dispensation du fentanyl transmuqueux à l'officine :** analyse pharmaceutique et conseils aux patients

20 avril 2016

Anne Sophie BENKOVSKY

# 1 - Introduction




# La douleur

« Une expérience désagréable, à la fois sensorielle et émotionnelle, associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel ou simplement décrit en termes d'un tel dommage. »

- *Prise en charge multidimensionnelle de l'individu*
- *Profils évolutifs de la douleur*
- *Mécanismes à l'origine de la douleur*

# Les accès douloureux paroxystiques



- Morphine ou oxycodone à libération immédiate
  - Fentanyl transmuqueux

# Les spécialités de fentanyl transmuqueux

- ▶ Une indication commune:

« Traitement des **ADP** chez des patients adultes atteints de **cancer** et recevant déjà un **traitement de fond** par morphinique pour des douleurs chroniques d'origine cancéreuse. »

- ▶ Posologie: 4 ADP maximum traités par jour
- ▶ Titration spécifique à chaque spécialité

# Les spécialités de fentanyl transmuqueux

Spécialités	Forme galénique	Délai d'action	Durée d'action
<i>Abstral®</i>	Comprimé sublingual	15mn	2-4h
<i>Actiq®</i>	Applicateur buccal	5-10mn	2-4h
<i>Effentora®</i>	Comprimé gingival	10mn	2h
<i>Instanyl®</i>	Pulvérisation nasale	10mn	1h
<i>Pecfent®</i>	Pulvérisation nasale	10mn	1h
<i>Breakyl®</i>	Film orodispersible	Non précisé	1h
<i>Recivit®</i>	Comprimé sublingual	6mn	1h


# Place dans la stratégie thérapeutique

- 50% ADP < 30 min

Avantages	Inconvénients
Délai d'action	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Effets indésirables liés à la voie d'administration</li><li>○ Dépendance et accoutumance</li><li>○ Pas d'équianalgésie</li><li>○ Difficulté de prise</li></ul>


- Spécialités les plus utilisées actuellement: morphine ou oxycodone LI

# 2- Etude



# Contexte

- 45% des prescriptions hors AMM (2011-2012) en Haute Normandie
- 512 patients ayant eu fentanyl transmuqueux en 2014 en HN



# Etude

- **Objectifs:** apprécier les connaissances des pharmaciens puis étudier les pratiques de dispensation en ville.
- **Matériel et méthode:** 2 questionnaires ont été réalisés


*On recense 512 pharmacies et 1344 pharmaciens en octobre 2015 en HN.*

	Quiz connaissances	Quiz ordonnances
<b>Objectifs</b>	Évaluer niveau de connaissances sur le fentanyl transmuqueux	Évaluer pratiques associées à chaque dispensation
<b>Cible</b>	Tous les pharmaciens (1344)	Pharmacies délivrant des transmuqueux (350)
<b>Résultats</b>	93 réponses	21 ordonnances analysées
<b>Représentation</b>	16% pharmacies et 7% pharmaciens	4% pharmacies

## Des délivrances occasionnelles:


### QUIZ CONNAISSANCES

- **58% des pharmaciens** ont délivré du fentanyl transmuqueux au cours des 12 derniers mois.
- Traitements des ADP selon l'étude ADEPI en 2010:



# Des spécialités mal connues par les pharmaciens

## QUIZ CONNAISSANCES



# Prescriptions ET dispensations hors AMM

## QUIZ CONNAISSANCES

45% des pharmaciens

- Délivrances hors indication de cancer

20% des pharmaciens

- Pas de prescription de traitement de fond associé


10% des pharmaciens

- Ne peuvent vérifier l'indication car ils ne connaissent pas les antécédents médicaux du patient

# Prescriptions ET dispensations hors AMM

## QUIZ ORDONNANCES

- **52%** des prescriptions concernent des douleurs non cancéreuses
- **24%** des ordonnances: posologie supérieure à l'AMM
- **24%** des ordonnances: pas de traitement de fond opioïde associé
- **14%** des ordonnances: traitement de fond inadapté  
(12 µg de fentanyl transdermique ou Oxynorm)



## Prescriptions ET dispensations hors AMM

### QUIZ ORDONNANCES

Au total : **24%** des prescriptions sont conformes en termes d'indication, posologie et traitement de fond.



2 ordonnances : discussion avec le prescripteur



TOUTES LES ORDONNANCES ONT ÉTÉ DÉLIVRÉES



## Diapositive 15

---

**a2**

anne.sophie; 19/04/2016

# Améliorer conseils aux patients

## QUIZ CONNAISSANCES

- 57% des pharmaciens estiment ne pas connaître suffisamment les spécialités pour apporter les conseils nécessaires
- 91% des pharmaciens souhaiteraient une fiche conseil pour le patient




Améliorer l'observance, diminuer le mésusage

## Un réel besoin de formation

- Acte de dispensation du médicament: *analyse, questionnement, délivrance, conseil et suivi.*
- 90% des pharmaciens souhaitent une formation spécifique sur le fentanyl transmuqueux (principalement sous format papier)
- OMÉDIT: fiches de bon usage

# 3- Conclusion



## Molécules efficaces dans les conditions d'utilisation de l'AMM



- Outils de formation
- Analyse pharmaceutique
- Communication primordiale entre les différents acteurs de santé
- Conseils aux patients



# Perspectives

